

Série : A Epreuve de : MATHÉMATIQUES
Durée : 2 heures 15 minutes
Code Matière : 09 Coefficients : A1 = 1 A2 = 3

N.B. : Le candidat doit traiter les DEUX exercices et le problème.

EXERCICE 1 (4 points)

On considère la suite numérique $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} U_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} = \frac{U_n^2 - U_{n-2}}{U_{n+1}} \end{cases}$$

- 1) Calculer les quatre premiers termes de cette suite. (1 pt)
- 2) a) Montrer que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique dont on précisera la raison. (1 pt)
b) Exprimer U_n en fonction de n . (0,5 pt)
c) Quel est le sens de variation de $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$? (0,25 pt)
- 3) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $V_n = e^{2(1-n)}$.
- a) Montrer que $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. (1 pt)
b) Calculer la limite de V_n quand $n \rightarrow +\infty$. (0,25 pt)

EXERCICE 2 (4 points)

Le tableau suivant indique l'évolution de l'effectif d'un Collège au cours des huit dernières années.

x_i désigne le rang de l'année et y_i l'effectif correspondant).

Année	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
y_i	370	360	380	410	420	440	450	470

- 1) Représenter le nuage de points $M_i(x_i, y_i)$ associé à cette série statistique dans un repère orthogonal.
- Sur l'axe des abscisses, prendre 1 cm pour unité graphique. (0,75 pt)
- Sur l'axe des ordonnées, placer 350 à l'origine puis choisir 1 cm pour représenter 10 élèves.
- 2) Calculer les coordonnées du point moyen G. (0,5 pt)
- 3) On note (S_1) la série statistique allant de 1994 à 1997 et (S_2) la série allant de 1998 à 2001.
- a) Déterminer les coordonnées des points moyens respectifs G_1 et G_2 des séries (S_1) et (S_2) . (0,5 + 0,5 pt)
b) Déterminer une équation cartésienne de la droite (D) passant par G_1 et G_2 . (0,75 pt)
c) Construire cette droite (D). Que représente-t-elle? (0,25 + 0,25 pt)
d) En déduire une estimation de l'effectif du collège en 2003. (0,5 pt)

La droite de régression

$$(G_1, G_2) \rightarrow ax + b$$

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$b = y_1 - ax_1$$

PROBLEME :

(12 points)

On considère la fonction numérique f définie par : $f(x) = 2 \ln x (\ln x - 1)$. On note (\mathcal{C}) la courbe représentative de f dans un plan rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1 cm.

- 1°) - a) Déterminer l'ensemble de définition D_f de f . (0,5 pt)
b) Calculer les limites aux bornes de D_f . (0,5 + 0,5 pt)
- (c) Montrer que pour tout $x \in D_f$, $f'(x) = \frac{2}{x}(2 \ln x - 1)$. (1 pt)
- d) Dresser le tableau de variation de f . (1 pt)
- 2°) - a) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de (\mathcal{C}) avec l'axe $(x'Ox)$. (1 pt)
b) Donner une équation de la tangente (T) à (\mathcal{C}) au point d'abscisse e . (1 pt)
c) Montrer que (\mathcal{C}) admet un point d'inflexion I dont on déterminera les coordonnées. (1 pt)
- 3°) - a) Etudier les branches infinies de (\mathcal{C}) (on admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$). (0,25 + 0,25 pt)
b) Calculer $f(e^{-1})$ et $f(e^2)$. (0,5 + 0,5 pt)
c) Construire (T) et (\mathcal{C}) . (0,5 + 1,5 pt)
- 4°) - Soit F la fonction définie par $F(x) = 2x (\ln x)^2 - 6x \ln x + 6x$. (1 pt)
a) Montrer que F est une primitive de f sur D_f .
b) Calculer, en cm^2 , l'aire \mathcal{A} du domaine plan limité par (\mathcal{C}) , l'axe $(x'Ox)$ et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$. (1 pt)

On donne : $e^{-1} \approx 0,4$; $e^{\frac{1}{2}} \approx 1,7$; $e \approx 2,7$; $e^{\frac{3}{2}} \approx 4,5$; $e^2 \approx 7,4$.