

Corrigé de
L'Epreuve de Biologie Animale, Zoologie et Physiologie Animale

Barème : * 0.25

PHYSIOLOGIE ANIMALE I



Réponse à la Question 1 : 3 points / 10

- 1a) Le milieu interieur correspondant au milieu extracellulaire** comprend le sang**, la lymphe* et le liquide interstitiel*.
1b) Le milieu interieur assure les conditions fondamentales nécessaires à la survie des cellules : -apport des nutriments*, oxygène*, sels* et eau*- excrétion des déchets métaboliques* et du gaz carbonique *.

Réponse à la Question 2 : 3 points / 10

- 2a) Les éléments figurés du sang sont les globules rouges*, les globules blancs* et les plaquettes sanguines*.
2b) Les différents types de globules blancs sont les neutrophiles*, les basophiles*, les acidophiles* (ou éosinophiles) et les monocytes*.
2c) Les globules rouges jouent un rôle dans le transport* et l'échange de gaz (oxygène, gaz carbonique) entre les poumons et les cellules*.
Les globules blancs interviennent dans la défense de l'organisme**.
Les plaquettes sanguines interviennent dans la coagulation sanguine*

Réponse à la question 3 : 4 points / 10

Rôles des protéines plasmatiques :

- transport des substances non solubles* dans le plasma** (transport des lipides par exemple*)
- défense de l'organisme**, rôle des gamma-globulines**,
- materiaux** des synthèses tissulaires**,
- origine de la pression oncotique** qui permet le renouvellement du milieu interstitiel**

Corrigé de
L'Epreuve de Biologie Animale, Zoologie et Physiologie Animale
Barème : * 0.25
ZOOLOGIE I

Réponse à la QUESTION 1 : 1 point/10

Les Spongiaires constitués de plusieurs cellules non groupées en tissus sont atissulaires* donc Parazoaires*. Les Cnidaires constituées de cellules organisées en tissus sont tissulaires* donc Eumetazoaires*.

Réponse à la QUESTION 2 : 3.5 point/10

- a) Ce sont des eumetazoaires, triploblastique, cétonates, protostomiens* à symétrie bilatérale à corps métamérisé (métamérie hétéronome*) par suite d'une régionalisation et d'une spécialisation des différentes parties du corps (tagmatisation se caractérisant principalement par une céphalisation).^{*}
Leur corps connaît d'un exosquelette riche en chitine (cuticule*) leur impose un développement discontinu et présente des appendices articulés*. Ce sont donc des Arthropodes*.

b) Principal caractère	Criquet	Crevette
Corps divisé en*	3 parties	2 parties
Paires d'antennes*	1	2
Abdomen*	napode	Avec pattes natatoires (pleopodes)
Paires de Pattes locomotrices*	3 (Hexapode)	5 (Decapode)*
Respiration avec*	trachées	Branchies
Ailes*	Présentes (Pterygote)	Absentes

Réponse à la QUESTION 3 : 5.5 point/10

a) Groupe des: Caractère distinctif	Polychètes	Cestodes	Nématodes
Morphologie du* corps et particularités	Cylindrique *a métamères semblables (métamérie homonomie) situées entre le prostomium et le pygidium portant chacun une paire de parapodes. Partie anteriorne permettant de définir une « tête » avec des organes sensoriels développés	Aplat et rubane. *non métamérisé, forme d'un scolex (tanne ou merme) porteur de ventouses ou de bothridies, d'un cou et d'un strobile (proglottis)	Cylindrique et filiforme *non métamérisé, pas de régions morphologiquement distinctes
Cuticule*	Fine, souple et mince	Plus ou moins épaisse et résistante aux sucs digestifs de l'hôte	Épaisse
Coelome*	Présent (coelomates*)	Absent (acoelomates*)	Absent (pseudocoelomates*)
Appareil digestif*	Complet avec bouche et anus	Absent	Complet avec bouche et anus
Appareil circulatoire*	Présent et clos	Absent	Absent
Appareil excretateur	Une paire de néphridies par métamère*	Protonephridien*	glandulaire ou tubulaire*
Type de reproduction sexuelle*	Gonochorisme	Hermaphrodisme	Gonochorisme
Mode de vie*	Libres (errants ou sédentaires)	Endoparasites	Libres (ou parasites*)

- b) - *Apparition d'organes de fixation plus ou moins complexes (ventouses, crochets chez les Cestodes).
- Disparition plus ou moins marquée des organes des sens (absents chez les Cestodes et beaucoup de Nématodes parasites).
- *Apparition d'une cuticule, assez épaisse, résistante aux sucs digestifs de l'hôte mais perméable aux métabolites (Cestodes et Nématodes).
- *Disparition de certains organes présents chez les formes libres (absence totale du tube digestif chez les Cestodes, des soies chez les nématodes parasites).
- *Accroissement de la fonction de reproduction accompagnée d'hermaphrodisme chez des Cestodes et complexité de l'appareil reproducteur assurant la production d'une grande quantité d'œufs.