

Exercice n°1

(3 pts)

Répondre par *vrai* ou *faux* en **justifiant** :

1°) Deux polynômes qui ont les même racines sont égaux.

2°) Dans un repère orthonormé on donne les points : A(0,1); B($\sqrt{3}, 1 - \sqrt{3}$) et C($\sqrt{3}, 1 + \sqrt{3}$).

(AB) et (AC) sont perpendiculaires.

3°) I ; J et K trois points non alignés et G leur barycentre affectés respectivement des

coefficients π ; 2π et 3π : alors $G(\frac{1}{3}, \frac{1}{2})_{(I, J, K)}$.

Exercice n°2

(8.5 pts)

Soit le polynôme $P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 5x - 6$.

1°) a) Calculer $P(-1)$.

b) En déduire le polynôme $Q(x)$ tel que : $P(x) = (x + 1)Q(x)$.

2°) Résoudre dans \mathbb{R} :

a) L'équation : $P(x) = 0$.

b) L'équation : $P(|x| - 4) = 0$.

c) L'inéquation : $P(x) < 0$.

3°) Soit la fonction rationnelle définie par : $f(x) = \frac{2x - 3}{P(x)}$.

a) Donner le domaine de définition D_f de f .

b) Montrer que $f(x) = \frac{1}{(x+1)(x+2)}$ pour tout réel $x \in D_f$.

c) Trouver les deux réels a et b tels que : $f(x) = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x+2}$.

d) En déduire rapidement la valeur de S :

$$S = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5} + \frac{1}{5 \times 6} + \frac{1}{6 \times 7} + \frac{1}{7 \times 8} + \frac{1}{8 \times 9}$$

Suite au verso.....

Exercice n°3*(8.5 pts)*

Le plan est muni d'un repère orthonormé $\mathcal{R} = (O, \vec{i}, \vec{j})$. Soient $A(2,0)$ et $B(1, \sqrt{3})$.

1°) a) Montrer que OAB est un triangle équilatéral.

b) Faire un schéma.

2°) Soit G le point tel que : $\vec{AG} = \frac{5}{2}\vec{AB}$.

a) Prouver que $AG = 5$.

b) En déduire une construction de G .

3°) Montrer que G est le barycentre de $(A, 3)$ et $(B, -5)$.

4°) Déterminer et construire l'ensemble $E = \{M \text{ tels que } (3\vec{MA} - 5\vec{MB}) \perp \vec{MO}\}$.

5°) Soit l'application f du plan définie par :

$$f : P \longrightarrow P$$

$$M \longrightarrow M' \text{ tel que : } 2\vec{MM'} = 3\vec{MA} - 5\vec{MB} - 2\vec{OM}$$

a) Montrer que f est une translation dont on précisera le vecteur.

b) Construire O' ; A' et B' images respectives de O, A et B par f .