

**Exercice n°1 : (3 points)**

Choisir l'unique bonne réponse et sans justification

- 1) Soit le polynôme  $P(x) = x(x^2 - x + 2)(x^2 + 1)$  alors  
 a)  $d^{\circ}P = 3$     b)  $d^{\circ}P = 4$     c)  $d^{\circ}P = 5$
- 2) Soit  $g(x) = ax^2 + bx + c$  et tel que  $g(1) = -2$  et  $g(2) = 2$  alors le trinôme  $g$  admet :  
 a) Deux racines distincts    b) Une unique racine    c) Aucune racine
- 3) Soit ABCD un parallélogramme. L'image de la droite (AD) par la translation du vecteur  $\overrightarrow{AC}$  est :  
 a) (AD)    b) (AC)    c) (BC)

**Exercice n°2 : (4 points)**

Soit les polynôme  $A(x) = -2x^3 + 3x + 1$  et  $B(x) = 2x^2 + x - 1$  et on considère le polynôme  $h$  définie par  $h(x) = A(x) - B(x)$

- 1) Vérifier que  $A(1) = B(1)$
- 2) Déduire une racine du polynôme  $h$
- 3) Déterminer  $b$  et  $c$  vérifiant :  $h(x) = (x - 1)(-2x^2 + bx + c)$
- 4) Résoudre dans  $h(x) \geq 0$

**Exercice n°3 : (6 points)**

Soit le polynôme :  $P(x) = 2x^3 - 7x^2 + 7x - 2$

- 1) a) Vérifier que 2 est une racine de P.  
 b) Factoriser P(x).  
 c) Résoudre dans IR l'équation  $P(x) = 0$ .
- 2) Soit la fonction définie par  $f(x) = \frac{P(x)}{x^2 + x - 6}$   
 a) Déterminer  $D_f$  l'ensemble de définition de f.

- b) Montrer que pour tout  $x \in D_f$  on a :  $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x + 3}$
- c) Résoudre dans IR :  $f(x) \geq 0$

**Exercice n°4 : (7 points)**

Soit ABC un triangle équilatéral et soit  $O = A * B$ ,  $I = A * C$  et  $J = B * C$ .  
 On note  $(\zeta)$  le cercle de diamètre [AB].

Soit  $t_{\overrightarrow{BC}}$  la translation de vecteur  $\overrightarrow{BC}$ .

- 1) Montrer que I et J sont deux points du cercle  $(\zeta)$ .
- 2) Construire le point  $E = t_{\overrightarrow{BC}}(A)$ .
- 3) a) Construire le cercle  $(\zeta')$  de diamètre [EC].  
 b) Montrer que  $(\zeta')$  est l'image du cercle  $(\zeta)$  par  $t_{\overrightarrow{BC}}$ .
- 4) Construire  $\Delta$  la droite passant par E et parallèle à (AC).  $\Delta$  coupe (BC) en F.  
 a) Déterminer  $t_{\overrightarrow{BC}}(BC)$  et  $t_{\overrightarrow{BC}}(AC)$ .  
 b) Déduire que  $t_{\overrightarrow{BC}}(C) = F$
- 5) La droite (BC) recoupe  $(\zeta')$  en K.  
 a) Montrer que  $k = t_{\overrightarrow{BC}}(J)$   
 b) Déduire que :  $K = C * F$ .

**Bon travail**