

Devoir de synthèse n°3 Année Scolaire 1999-2000 2^{ème} Année.

Exercice n° 1 :

On donne les fonctions f et g définies sur \mathbb{R} par : $f(x) = \frac{-2}{x+2}$ et $g(x) = \frac{1}{2}(x+1)^2$

- 1) Etudier f et g et tracer dans repère orthonormée (O, \vec{i}, \vec{j}) les courbes représentatives C_f et C_g .
- 2) On pose $h(x) = \frac{1}{2}x^2 + x - \frac{3}{2}$
 - a) Montrer que $h(x) = g(x) - 2$ puis tracer C_h à partir de C_g et donner le tableau de variation de h .
 - b) Résoudre graphiquement l'inéquation $\frac{1}{2}x^2 < -x + \frac{3}{2}$.
- 3) On pose $k(x) = \frac{1}{|x+2|}$.
 - a) Tracer la courbe C_k à partir de C_f puis donner le tableau de variation de k .
 - b) Résoudre graphiquement $\frac{1}{|x+2|} < 1$.

Exercice n° 2 :

Dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) on donne le point $I(5, 4)$.

- 1) Ecrire une équation cartésienne de \mathcal{C} le cercle de centre I de rayon 5 puis montrer que \mathcal{C} et l'axe des ordonnées $(y'y)$ sont tangents en un point T dont-on précisera les coordonnées.
- 2) Le cercle \mathcal{C} coupe l'axe des abscisses $(x'x)$ en deux points A et B .
Chercher les coordonnées de A et B puis montrer que $OA \cdot OB = OT^2$.
- 3) On pose Δ_A et Δ_B les tangentes au cercle \mathcal{C} en A et B .
 - a) Ecrire une équation cartésienne pour chacune des droites Δ_A et Δ_B .
 - b) Chercher les coordonnées du point C le point d'intersection de Δ_A et Δ_B .
 - c) Calculer l'aire S du triangle ABC .
- 4) On pose $\mathcal{C}' = \{M(x, y) ; x^2 + y^2 + 2x + 8y - m^2 + 3m - 10 = 0\}$ où m est un paramètre réel.
 - a) Montrer que \mathcal{C}' est un cercle pour tous $m \in \mathbb{R}$.
 - b) Donner le centre I' du cercle \mathcal{C}' pour $m = 2$ et montrer dans ce cas que \mathcal{C} et \mathcal{C}' sont tangentes extérieurement.

Exercice n° 3 :

- 1) On donne $x \in [0, \pi]$ et on pose $f(x) = -8\sin^4x + 6\sin^2x - 1$.
 - a) Calculer $f(0)$, $f(\frac{\pi}{2})$ et $f(\frac{\pi}{6})$.
 - b) Montrer que $f(x) = (4\cos^4x - 3)(2\sin^2x - 1)$.
 - c) Résoudre dans l'intervalle $[0, \pi]$ l'équation $f(x) = 0$.
- 2) On donne $x \in]0, \pi[\setminus \{\frac{\pi}{2}\}$.
 - a) Montrer que $\operatorname{tg}x + \frac{1}{\operatorname{tg}x} = \frac{1}{\cos x \cdot \sin x}$.
 - b) En déduire que $\operatorname{tg}^2x + \frac{1}{\operatorname{tg}^2x} = \frac{1}{\sin^2x \cdot \cos^2x} - 2$.

