

L.S.F.B.MONASTIR	Devoir de Synthèse N°: 3 - Mathématiques-	<u>Classe</u> : 2èmeSC6 <u>Date</u> : 01/ 06/2012 <u>Durée</u> : 2 heures
-------------------------	---	---

Nom et Prénom :.....	Note :...../20
----------------------	----------------

EXERCICE N°1 : (3pts) (QCM)

Pour chacune des questions suivantes une seule des trois réponses proposées est exacte. Cocher la réponse exacte. Aucune justification n'est demandée.

Le plan est rapporté à un repère orthonormé (o, \vec{i}, \vec{j}) .

❶ Le cercle (ζ) d'équation cartésienne $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ a pour centre I et de rayon r tel que :

- I (1 ; -2) et r = 2
 I (-1 ; 2) et r = 3
 I (1 ; -2) et r = 3

❷ Soit $f(x) = x^2 + 2x + 3$ et (ζ_f) sa courbe dans (o, \vec{i}, \vec{j}) alors (ζ_f) est une parabole de sommet S et d'axe de symétrie la droite dont une équation est $x = a$ tel que :

- S (-1 ; 2) et a = -1
 S (-1 ; 2) et a = 3
 S (2 ; 3) et a = 2

❸ Soit $g(x) = 1 + \frac{3}{x-2}$ et (ζ_g) sa courbe dans (o, \vec{i}, \vec{j}) alors (ζ_g) est une hyperbole de centre Ω tel que :

- $\Omega (2 ; 1)$
 $\Omega (-2 ; 1)$
 $\Omega (-2 ; -1)$

EXERCICE N°2 : (5pts)

Le plan est rapporté à un repère orthonormé (o, \vec{i}, \vec{j}) .

Soit ζ l'ensemble des points M(x, y) tels que : $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6 = 0$.

❶ a) Montrer que ζ est un cercle de centre A (1, 3) et de rayon 2.

b) Vérifier que E (1, 5) est un point du cercle ζ .

c) Déterminer l'équation de la tangente T au cercle ζ au point E.

② a) Déterminer l'équation de la droite D parallèle à T et passant par A.

b) Déterminer les coordonnées des points I et J d'intersection de D et ζ .

c) En déduire que EIJ est un triangle rectangle.

EXERCICE N°3 : (8pts)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{3x-3}{x-2}$.

① a) Vérifier que $f(x) = 3 + \frac{3}{x-2}$

b) Etudier le sens de variation de f sur chacun des intervalles $]-\infty, 2[$ et $]2, +\infty[$.

Variations sur $]-\infty, 2[$


Variations sur $]2, +\infty[$



c) Dresser le tableau de variation de f.

x	$-\infty$	$+\infty$
f(x)		

d) Tracer (ζ_f) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé (o, \vec{i}, \vec{j})



2 Soit la fonction g définie par $g(x) = \frac{3|x|-3}{|x|-2}$

a) Déterminer le domaine de définition de g .

b) Montrer que g est paire.

c) Montrer que $g(x) = f(x)$ si $x \geq 0$.

d) Dédurre, à partir de la courbe (ζ_f) le traçage de la courbe (ζ_g) de g dans le même repère (o, \vec{i}, \vec{j}) .

e) En déduire le tableau de variation de g .

x	$-\infty$	$+\infty$
$g(x)$		

f) Discuter suivant les valeurs du paramètre réel m , le nombre de solutions de l'équation $g(x) = m$

EXERCICE N°4 : (4pts)

Soit la suite u définie sur \mathbb{N} par :
$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = 5u_n - 2, n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

❶ a- Calculer u_1 et u_2 .

$u_1 =$ ----- $u_2 =$ -----

b- Vérifier que u_n est ni arithmétique ni géométrique.

❷ On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$; $v_n = u_n - \frac{1}{2}$.

a- Montrer que v_n est une suite géométrique de raison 5.

b- Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .

❸ Calculer $S = v_1 + v_2 + \dots + v_6$ puis $S' = u_1 + u_2 + \dots + u_6$.

$S =$ -----

$S' =$ -----
