

Exercice N°1 : (11 pts)

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Soit la fonction

$$x \mapsto \frac{2}{x-1}$$

1-/ Etudier f puis tracer sa courbe représentatives ζ_f dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) .2-/ Soit la droite D d'équation : $y = x - 2$ a) Tracer D dans le même repère.b) Déterminer par le calcul les coordonnées des points A et B intersections de D et ζ_f .c) Résoudre graphiquement l'inéquation : $\frac{-x^2 + 3x}{x-1} \leq 0$.3-/ On considère la fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \quad x \mapsto \frac{2}{|x|-1}$ a) Déterminer le domaine de définition de la fonction g .b) Prouver que g est une fonction paire.c) Vérifier que : $g(x) = f(x)$ pour $x \in \mathbb{R}_+ \setminus \{1\}$.d) Tracer la courbe ζ_g dans le même repère et à partir de la courbe ζ_f .e) Dédurre le tableau de variation de g .Exercice N°2 : (9 pts)**I** – Soit un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) Soit ζ un cercle de centre $A(2,1)$ et tangent à la droite $T : x + 2y - 9 = 0$.1-/ Ecrire une équation du cercle ζ .2-/ Déterminer les coordonnées des points d'intersections de ζ avec la droite des ordonnées.**II** – Soit ξ l'ensemble des points $M(x, y)$ du plan tel que : $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$.1-/ Montrer que ξ est un cercle dont on déterminera le centre I et le rayon R .2-/ a) Vérifier que $B(-2, -2) \in \xi$.b) Déterminer une équation cartésienne de la tangente Δ au cercle ξ au point B .3-/ Soit la droite $D_m : x - my + 1 = 0$. Où m est un paramètre réel.Déterminer m pour que D_m coupe ξ en deux point E et F tel que $EF = 2R$.4-/ Déterminer la position relative du ζ et ξ .Bon Travail