

### EXERCICE N°1 (3,5pts)

Répondre par vrai ou faux en justifiant :

Soit  $f(x) = 2x^4 + 2x^2 + 3x - 1$

$g(x) = ax^3 + bx^2 + 4x$  ou  $a \in \mathbb{R}$  ;  $b \in \mathbb{R}$   $c \in \mathbb{R}$

$h(x) = \alpha x^4 - 2x^2 + 4x - 1$   $\alpha \in \mathbb{R}$

1°) (-1) est une racine de f.

2°) f peut avoir 5 racines distinctes.

3°) Zéro est une racine de g.

4°) Le degré de g est 3.

5°) Le degré de f+h est 4.

6°) On peut trouver  $\alpha$  tel que le degré de f+h est 1

7°) Soient A ; B et C trois points distincts du plan et K le barycentre des points pondérés

(A, 1) ; (B, 2) et (C, 6) alors :  $9\overrightarrow{AK} = 2\overrightarrow{AB} + 6\overrightarrow{AC}$  .

### EXERCICE N°2 (6pts)

Soit les polynômes  $P(x) = -2x^2 - 3x + 5$  et  $G(x) = x^2 + 5x + 6$   $Q(x) = x^4 + 6x^3 + 9x^2 - 4x - 12$

1/ a) Factoriser les polynômes P(x) et G(x).

b) Vérifier que 1 et (-2) sont des racines de Q.

c) Dédurre la factorisation de Q en produit de binômes de 1<sup>er</sup> degré

2/ Soit la fonction rationnelle f définie par  $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$

a) Déterminer l'ensemble de définition ( $D_f$ ) de f

b) Montrer que pour tout x de  $D_f$  on a :  $f(x) = \frac{-2x-5}{(x+2)^2(x+3)}$

c) Soit  $H(x) = \sqrt{f(x)}$  ; Déterminer l'ensemble de définition de H

d) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $H(x) = \sqrt{x-2009}$

### EXERCICE N°3 (2,5pts)

1/ a) Résoudre l'équation  $x^2 - 5x - 6 = 0$

b) Soient x et y deux réels tel que  $xy = 5\sqrt{xy} + 6$  ; Montrer que  $xy = 36$

2/ Soit le système  $\begin{cases} xy = 5\sqrt{xy} + 6 \\ x + y + xy = 49 \end{cases}$  ou x et y sont des inconnues réelles

Déterminer alors les valeurs possibles de x et y

### EXERCICE N°4 (8pts)

Soit ABC un triangle rectangle en A et O le milieu de [AB]

1/ Construire le point D image de B par la translation de vecteur  $\overrightarrow{CA}$

Déduire la nature du quadrilatère AD BC

2/ a) Construire les points : I barycentre des points pondérés (B ;1) et (D ;2)

et G le barycentre des points pondérés (A ;1) et (I ;3)

b) Montrer que G est le barycentre des points pondérés (A ;1) ; (B ; 1) et (D ;2)

c) Montrer que G est le milieu de segment [OD]

d) Montrer que G est le barycentre de (C ; 1) et (D ;3)

e) Déduire que (AI) et (CD) sont sécantes en G

3/ Déterminer les ensembles suivants :

$$\Delta = \left\{ M \in P / \left\| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MD} \right\| = \frac{4}{3} \left\| \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MD} \right\| \right\}$$

$$S = \left\{ M \in P / \left\| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MD} - \overrightarrow{MG} \right\| + \left\| \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MD} \right\| = 3GI \right\}$$

4/ Soit  $f : P \rightarrow P$

$$M \mapsto M' \text{ tel que } \overrightarrow{DM'} = 4\overrightarrow{DM} - 3\overrightarrow{IM}$$

a/ Montrer que  $\overrightarrow{MM'} = 3\overrightarrow{DI}$

b/ Déduire que f est la translation de vecteur  $\overrightarrow{DB}$