

20

LYCEE PILOTE MEDENINE	Devoir de Synthèse N°2 Durée: 2h	Profs: M <sup>me</sup> Chtéoui Faiïza M <sup>r</sup> Guetet Afif
Date: 03/03/2009		2 <sup>ème</sup> Sc <sub>1+2+3</sub>

**Exercice N°1:** (3 points).

Chaque question comporte trois réponses notées: a), b) et c). Une seule réponse est correcte Cocher la. (Aucune justification n'est demandée).

- Une suite constante est :
  - Géométrique de raison 1.
  - arithmétique de raison 1
  - ni arithmétique ni géométrique.
- Si une suite  $(u_n)$  est telle que :  $u_0 \times u_2 = u_1^2$ , alors  $(u_n)$  :
  - est géométrique
  - n'est pas géométrique
  - n'est pas forcément géométrique.
- Si  $\cos^2 x = \frac{3}{4}$  et  $\text{tg} x < 0$ , alors :
  - $x = \frac{\pi}{6}$
  - $x = \frac{2\pi}{3}$
  - $x = \frac{5\pi}{6}$
- L'ensemble de solutions de l'équation  $\text{tg}^2 x - (\sqrt{3} + 1)\text{tg} x + \sqrt{3} = 0$  dans l'intervalle  $]\frac{\pi}{2}, \pi]$  est :
  - $\{\frac{3\pi}{4}\}$
  - $\{\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}\}$
  - l'ensemble vide.

**Exercice N°2:** (7 points).

On considère la suite  $(u_n)$  définie sur  $\mathbb{N}$  par:

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = 0 \\ u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n \text{ pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

- Calculer  $u_2$  et  $u_3$ .
  - La suite  $(u_n)$  est-elle arithmétique ? Est-elle géométrique ?
- On considère les suites  $(a_n)$  et  $(b_n)$  définies sur  $\mathbb{N}$  par:

$$a_n = u_{n+1} - 2u_n \quad \text{et} \quad b_n = u_{n+1} + u_n.$$

- Montrer que  $(a_n)$  et  $(b_n)$  sont deux suites géométriques de raisons respectives  $(-1)$  et  $2$ .
  - Exprimer  $a_n$  et  $b_n$  en fonction de  $n$ .
  - En déduire que  $u_n = \frac{2}{3}[2^{n-1} + (-1)^n]$ .
- Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+2} = 2(u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n)$ .
    - En déduire la valeur de la somme  $S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{15}$ .

**Exercice N°3:** (6 points).

Soit l'expression :  $f(x) = \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x}$ , où  $x$  est un réel de l'ensemble  $I = [0, \pi] \setminus \{ \frac{3\pi}{4} \}$ .

1. Calculer  $f(0)$ ,  $f(\frac{\pi}{4})$  et  $f(\frac{\pi}{6})$ .
2. a) Montrer que pour tout  $x \in I \setminus \{ \frac{\pi}{2} \}$ , on a :  $f(\pi - x) \times f(x) = 1$ .  
b) En déduire  $f(\frac{5\pi}{6})$ .
3. a) Montrer que pour tout  $x$  de l'ensemble  $I \setminus \{ \frac{\pi}{2} \}$ , on a  $f(x) = \frac{1 - \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg} x}$ .  
b) Sachant que  $f(x) = -\frac{1}{7}$ , Calculer  $\operatorname{tg} x$ ,  $\cos x$  et  $\sin x$ .
4. Soit  $\alpha$  un réel de l'intervalle  $[0, \frac{\pi}{4}]$  tel que  $\cos \alpha \times \sin \alpha = \frac{2}{5}$ .  
a) Montrer que  $\cos \alpha + \sin \alpha = \frac{3\sqrt{5}}{5}$ .  
b) Sachant que  $\cos \alpha > \sin \alpha$ , calculer  $f(\alpha)$ . (Utiliser la 1<sup>ère</sup> forme de  $f(x)$ )

**Exercice N°4:** (4 points).

ABCD est un quadrilatère convexe, soit I le point d'intersection de (AC) et (BD).

On pose  $\widehat{BIC} = \alpha$  et on désigne par H le projeté orthogonal de B sur (AC).

1. Montrer que l'aire du triangle IBC est  $a = \frac{1}{2} \operatorname{IB} \cdot \operatorname{IC} \cdot \sin \alpha$ .
2. En exprimant de même les aires de chacun des triangles IAB, IAD et ICD, montrer que l'aire de ABCD est  $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \operatorname{AC} \cdot \operatorname{BD} \cdot \sin \alpha$ .
3. Application: On donne un rectangle ABCD de centre O tel que  $\widehat{AOB} = \frac{5\pi}{6}$  et  $\operatorname{AC} = 12$ .

Montrer que  $\operatorname{AB} = 3(\sqrt{6} + \sqrt{3})$  et  $\operatorname{AD} = 3(\sqrt{6} - \sqrt{3})$ .