

Exercice 1 :

Soit f, g deux fonctions définies par : $f(x) = \sqrt{x+1}$ et $g(x) = \frac{2}{x-1}$

- 1) Étudiez les fonctions f et g et tracez leur courbe respective ξ_f, ξ_g dans un même repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) .
- 2) On considère l'équation (E) : $x^3 - 3x - 2 = 0$
 - a- Vérifiez que 2 est une racine de l'équation (E).
 - b- Déterminez les réels b et c tel que : $x^3 - 3x - 2 = (x-2)(ax^2 + bx + c)$.
 - c- En déduire l'ensemble de solution de (E).
- 3) Vérifiez par le graphique que ξ_f, ξ_g se rencontrent en un point A déterminez par le calcul les coordonnées du point A.
- 4) a) Résoudre par le calcul l'inéquation $g(x) \leq f(x)$.
b) En déduire par le graphique les solutions de l'inéquation.

Exercice n°2 :

I- Dans le plan rapporté à un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j})

On a $A(2,1), S(3,2)$ et $F(4,3), u = \sqrt{2}/2 \vec{i} + \sqrt{2}/2 \vec{j}$; $v = \sqrt{2}/2 \vec{i} - \sqrt{2}/2 \vec{j}$

D : d'équation $x + y - 3 = 0$ Δ : d'équation $-x + y - 2 = 0$

- 1) Montrez que $(S\vec{u}, \vec{v})$ forme un repère orthonormé
 - 2) Exprimez \vec{i}, \vec{j} à l'aide de \vec{u} et \vec{v} .
 - 3) En déduire par les coordonnées de A dans ce nouveau repère
- II)
- 1) Donnez une équation cartésienne de la droite (AS)
 - 2) Montrez que :
 - a) $(AS) \parallel \Delta$
 - b) (AS) et D sont sécantes, déterminez leur point d'intersection
 - c) (SA) et D sont perpendiculaires

- 3) Déterminez l'équation de la droite Δ_f passant par f et perpendiculaire à D .
- 4) Soit ξ ensemble des points $M(x, y)$ tel que : $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 11 = 0$
- a) Montrez que : a) ξ est un cercle dont on précisera le centre et le rayon
- b) Vérifiez que A est un point de ce cercle.
- c) Déterminez l'équation de la tangente à ce cercle au point A.

Exercice n°3 :

- 1) Construire l'angle α appartenant à $[0, \pi]$ tel que :
- a) $10 \cos \alpha - 3 = 0$
- b) $5 \sin \alpha = 4$
- 2) On considère un demi cercle de diamètre $[AB]$, de centre O et de rayon 1
M un point du demi cercle $\widehat{MAB} = \alpha$, H projeté orthogonal de M sur $[AB]$
- a) Calculez \widehat{MOB} en fonction de α .
- b) Montrez que $AM = 2 \cos \alpha$
- c) On suppose que l'angle \widehat{MOB} est aigu
Calculez MH de deux façons et en déduire que $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$
Calculez OH de deux façons et en déduire que $2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$
- 3) On considère un triangle ABC on pose $BC=a$, $AC=b$ et $AB=c$, On désigne par K le projeté orthogonal de C sur (AB), on suppose que l'angle \widehat{BAC} est aigu.
- a) Calculez AK, BK CK en fonction de a, b, c et \widehat{A} .
- b) En déduire la relation d'AL-KHASHI : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \widehat{A}$