



3^{ème} Maths : M₃₊₁
Date : le 26 / 2 / 2011

Durée : 2heures
Coefficient : 4


Enseignants : Belkacem Habib
Ghadhab Lassad

Exercice N°1 :

3 points

La courbe C_f ci-dessous représente une fonction f définie et dérivable sur \mathbb{R} . On note f' la dérivée de la fonction f . On sait que :

- la courbe coupe l'axe des ordonnées au point A et la tangente à la courbe au point A passe par le point C de coordonnées $(-2;0)$.
- la courbe admet au point B d'abscisse 1 une tangente parallèle à l'axe des abscisses ;
- l'axe des abscisses est asymptote à la courbe C_f .



1) A partir du graphique et des renseignements fournis :

- Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- Déterminer $f'(0)$ et $f'(1)$.

2) Une des trois courbes ci-dessous est la représentation graphique de la fonction f' . Déterminer laquelle. (Justifier)

0,5




0,75

0,5

Courbe C_1

Courbe C_2

Courbe C_3



3) Soit g la fonction définie sur \mathbb{R} par $g(x) = [f(x)]^2$.

- Exprimer $g'(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.
- Donner le sens de variation de g .

0,5

0,75



Exercice N° 2:

4 points

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{4\sin 2x}{2\cos 2x - 1}$.

- 1) a – Résoudre dans $[0, \pi]$ l'équation : $2\cos 2x - 1 = 0$.
 b – Résoudre dans $[0, \pi]$ l'inéquation : $f(x) \geq 0$.
- 2) Montrer que pour tous réels a et b différents de $\frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}$,

$$\tan(a) + \tan(b) = \frac{\sin(a+b)}{\cos a \cos b}$$

- 3) Soit $x \in \left] -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6} \right[$.

a – En utilisant la question 2), démontrer que $f(x) = \tan\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + \tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$.

b – Exprimer $f\left(\frac{\pi}{12}\right)$ en fonction de $\tan\left(\frac{5\pi}{12}\right)$.

c – En déduire que : $\tan\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \sqrt{3} + 2$.

0,5

1

0,5

0,75

0,25

1

Exercice N° 3:

3 points

$R = (O, \vec{i}, \vec{j})$ est un repère orthonormé direct du plan.


$OABC$ est un carré de centre S tel que $OA = 2$,

$(\vec{i}, \widehat{OA}) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$ et $C(\sqrt{3}, -1)$ dans le repère R

- 1) Déterminer les coordonnées cartésiennes des points A et B

- 2) Déterminer les coordonnées polaires de chacun des points C, B et S .

- 3) En déduire la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$



1

1,25

0,75

Exercice N° 4:

5 points

Dans un plan orienté \mathcal{P} , on considère un triangle équilatéral direct ABC . On note I le milieu de $[BC]$

Soit $r_1 = R_{\left(A, \frac{\pi}{3}\right)}$ la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$,

et par $r_2 = R_{\left(B, -\frac{2\pi}{3}\right)}$ la rotation de centre B et d'angle $-\frac{2\pi}{3}$.

Soit D le symétrique de A par rapport à I .



1) a – Quelle est la nature du quadrilatère $ABDC$.

b – Montrer que $r_2(A) = D$

0,5
0,5

2) Soit $B' = r_2(C)$. Montrer que B est le milieu de $[AB']$.

0,5

3) On pose $f = r_2 \circ r_1^{-1}$.

a – Montrer que $S_{(AB)} \circ S_{(AI)} = r_1^{-1}$ (r_1^{-1} est la réciproque de r_1)

0,5

b – Montrer que $S_{(BC)} \circ S_{(BA)} = r_2$

0,5

c – En déduire que f est une symétrie centrale dont on précisera le centre.

0,5

d – Soit $M_1 = r_1(M)$ et $M_2 = r_2(M)$

0,5

Montrer que I est le milieu de $[M_1M_2]$.

4) a – Construire le point E tel que $r_1(D) = E$.

0,5

b – Montrer que E, C et B sont alignés.

0,5

c – En déduire que C est le milieu de $[BE]$.

0,5

Exercice N° 5:

5 points

Soit la fonction $f_m : x \mapsto \frac{x^2 + 5x + m}{x}$ où m un paramètre réel **non nul**.

On désigne par ζ_m la courbe de f_m dans un repère orthonormé $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$.

1) a – Montrer que la droite Δ définie par une équation $y = x + 5$ est une asymptote à ζ_m aux voisinages de $+\infty$ et $-\infty$.

0,5

b – Etudier les variations de f_m suivant les valeurs de m .

1,5

c – En déduire l'ensemble des réels m tels que f_m admette un minimum et un maximum.

0,5

2) Soient M et N les points de ζ_m correspondants au maximum et au minimum de f_m .

a – Calculer les coordonnées de M et N en fonction de m .

0,5

b – Déterminer l'ensemble de ces points lorsque m varie.

0,5

3) Dresser le tableau de variation de f_1 et tracer sa courbe ζ_1 .

1,5

