




Exercice 1 : (4 points) (1 + 0,5 + 0,5 + 0,25 + 0,25 + 0,75 + 0,75)

Sur la figure ci-dessous est tracée la courbe représentative notée C_f dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) d'une fonction f définie sur \mathbb{R} . On sait que :

- La droite Δ d'équation $y = 2x + 4$ est asymptote à la courbe C_f en $+\infty$.
- La droite d'équation $y = 0$ est asymptote à la courbe C_f en $-\infty$.
- La courbe C_f admet une tangente parallèle à l'axe des abscisses aux points $B(-3, 2)$ et $C(-1, -2)$.
- La courbe C_f admet une demi tangente T et une demi tangente verticale au point $A(-4, -2)$.



À partir du graphique et des renseignements fournis :

- 1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 2x]$; .
- 2) Déterminer $f'(-1)$ et $f'(-3)$.
- 3) a - Déterminer $f'_d(-4)$.
b - f est elle dérivable à gauche en -4 ? Justifier.
c - Déterminer $\lim_{x \rightarrow (-4)^-} \frac{f(x) - f(-4)}{x + 4}$.
- 4) Soit g la fonction définie sur \mathbb{R} par $g(x) = x^2 f(x)$.
a - Montrer que $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{g(x) - g(-1)}{x + 1} = 4$.
b - Donner alors une équation cartésienne de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse -1 .

Exercice 2 : (8 points) (I – 0,5 + 0,75 + 0,75 + 0,5 + 0,5)
(II – 0,5 + 0,75 + 0,75 + 1 + 1 + 1)

I – Soit la fonction h définie sur $]-\infty, -4] \cup [0, +\infty[$ par $h(x) = \sqrt{x^2 + 4x} + x + 2$.
 C_h sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) .

1) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$.

2) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$. Interpréter graphiquement le résultat.

3) a – Montrer que pour tout $x \in]0; +\infty[$ on a $h(x) - 2x = \frac{8 - \frac{4}{x}}{\sqrt{1 + \frac{4}{x}} + 1 - \frac{2}{x}}$.

b – En déduire que la courbe C_h admet une asymptote Δ d'équation $y = 2x + 4$.

c – Pour $x \in]0; +\infty[$, comparer $\sqrt{x^2 + 4x}$ et $(x + 2)$ puis étudier la position relative sur $]0; +\infty[$ de C_h et Δ .

II – On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par :

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + 4x} + x + 2 & \text{si } x \in]-\infty, -4[\cup]0, +\infty[\\ x^3 + 6x^2 + 9x + 2 & \text{si } x \in [-4, 0] \end{cases}.$$

C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) .

1) Montrer que f est continue en 0.

2) a – Etudier la dérivabilité de f à droite en 0. Interpréter le résultat graphiquement.

b – Montrer que f est dérivable à gauche en 0 et déterminer $f'_g(0)$.

3) a – Montrer que f est dérivable en tout réel a de $]0; +\infty[$ et que $f'(a) = \frac{a+2}{\sqrt{a^2+4a}} + 1$

b – Déterminer le réel a tel que la tangente T à C_f au point d'abscisse a soit parallèle à la droite $D: y = (\sqrt{2} + 1)x - 1$.

c – Soit les deux points $A(0,1)$ et $B(m, \sqrt{2})$ où m un paramètre réel.


Déterminer m pour que la droite (AB) soit perpendiculaire à T .

Exercice 3: (5 points) (1+1+0,5+1+1,5)

Dans le plan orienté dans le sens direct, on considère un cercle ζ de centre A et de rayon 4.

Soient B, C et D trois points de ζ tels que : $(\overrightarrow{AB}, \widehat{\overrightarrow{AC}}) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$ et $(\widehat{\overrightarrow{AC}}, \overrightarrow{AD}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$

On considère le carré $BRSC$. (Voir figure ci-dessous)



- 1) *a* – Déterminer une mesure de chacun des angles orientés : $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$ et $(\overrightarrow{BS}, \overrightarrow{BA})$.
b – Calculer $\det(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB})$.
- 2) *a* – Déterminer une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC})$.
b – En déduire que $(\widehat{\overrightarrow{DA}}, \overrightarrow{DB}) \equiv \frac{\pi}{12} [2\pi]$
- 3) Déduire de ce qui précède que $(BS) \perp (DB)$.

Nom : Prénom : N° :

Exercice QCM : (3 points)

Pour chacune des questions suivantes, une seule des trois réponses proposées est exacte. Cocher alors la bonne réponse :

- 1) Soit θ la mesure principale de l'angle orienté dont une mesure est $\frac{-35\pi}{3}$
- a) $\theta = \frac{-5\pi}{3}$ b) $\theta = \frac{\pi}{3}$ c) $\theta = \frac{-2\pi}{3}$

- 2) Soit quatre vecteurs $\vec{t}, \vec{u}, \vec{v}$ et \vec{w} tels que $(\vec{t}, \vec{u}) \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi]$; $(\vec{u}, \vec{v}) \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi]$ et $(\vec{w}, \vec{v}) \equiv \frac{5\pi}{12} [2\pi]$
- a) \vec{t} et \vec{v} sont colinéaires
- b) \vec{t} et \vec{w} sont colinéaires
- c) \vec{u} et \vec{v} sont colinéaires

- 3) Soit f une fonction dérivable sur $] -1, +\infty [$ telle que : $f(x) = -2\sqrt{x+1}$ et $f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{x+1}}$

Alors une approximation affine de : $-2\sqrt{4,0001}$ est :

- a) $-4,00005$
- b) $4,00005$
- c) $-3,00005$