

EXERCICE:1

- 1- Soit f_1 la fonction définie par $f_1(x) = \frac{3-x}{x}$ et (Cf_1) sa courbe représentative orthonormé (o, \vec{i}, \vec{j}) . Etudier f_1 et construire (Cf_1)
- 2- Soient A et B les deux points de (Cf_1) d'abscisses respectives 1 et 3; déterminer l'équation cartésienne de (AB) trouver les équations cartésiennes des tangentes à (Cf_1) parallèle à (AB)
- 3- Une parallèle à (o, \vec{j}) coupe (Cf_1) en M et (AB) en N on pose $P=M*N$ et que $P(x,y)$
- a- Montrer que $y = \frac{-x^2+2x+3}{2x}$
- b- Construire dans le même repère l'ensemble des point P noté (C_2)
- c- Trouver les coordonnées de P de (C_2) distinct de A pour que le triangle AMN soit isocèle en A

EXERCICE:2

Soit f la fonction définie par: $f(x) = \frac{-x^2+x+1}{x+1}$ et (Cf) sa courbe représentative

orthonormé (o, \vec{i}, \vec{j}) .

- 1- Montrer qu'il existe trois réels a, b, et c qu'on les déterminera tel que pour tout x de Df on a: $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-2}$
- 2- Etudier f et construire (Cf)
- 3- Montrer que (Cf) admet un centre de symétrie I que l'on précisera
- 4- On définit deux fonctions g et h par: $g(x) = \left| \frac{-x^2+x+1}{x+1} \right|$ et $h(x) = \frac{-x^2+|x|+1}{|x|+1}$
expliquer comment obtenir les courbes (Cg) et (Ch) à partir de (Cf) et les construire dans le même repère

EXERCICE:3

Soit f la fonction définie par: $f(x) = \frac{2x^2 - 4x + 2}{2x + 3}$

On désigne par ζ_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé (o, \vec{i}, \vec{j})

- 1- Etudier les variations de f, Préciser les asymptotes de ζ_f
- 2- Montrer que le point I intersection des deux asymptotes est un centre de symétrie pour ζ_f , Tracer ζ_f
- 3- Utiliser le graphique pour discuter les solutions de l'équation $(E_p): 2x^2 - (2+p)x - 3p + 2 = 0$
- 4- Donner une équation de la tangente à ζ_f au point d'abscisse 3
- 5- Soit D_m de coefficient directeur m et passant par le point $B(-\frac{3}{2}, -\frac{20}{9})$

Etudier graphiquement, suivant les valeurs de m, l'intersection de D_m et ζ_f

