

### Définition :

Il existe un ensemble noté  $\mathbb{C}$ , appelé **ensemble des nombres complexes** qui possède les propriétés suivantes :

- 1) L'ensemble  $\mathbb{C}$  contient l'ensemble des nombres réels  $\mathbb{R}$ .
- 2) Il existe un élément de  $\mathbb{C}$ , noté  $i$ , tel que  $i^2 = -1$ .
- 3) L'addition et la multiplication des nombres réels se prolongent aux nombres complexes et les règles de calcul restent les mêmes.
- 4) Tout élément  $z$  de  $\mathbb{C}$  s'écrit de façon unique :  $z = a + ib$  où  $a$  et  $b$  sont des réels.

L'écriture  $z = a + ib$  avec  $a$  et  $b$  réels est appelée **forme algébrique** ou **forme cartésienne** du nombre complexe  $z$ .  $a$  est la **partie réelle** de  $z$ , notée  $Re(z)$ ,  $b$  est la **partie imaginaire** de  $z$  notée  $Im(z)$ .

### Remarque :

Soit  $z = a + ib$  un nombre complexe donné sous forme cartésienne.

- Si  $b = 0$ ,  $z$  est réel.
- Si  $a = 0$ ,  $z$  est dit **imaginaire pur**.

### Conséquences :

Soit  $z$  et  $z'$  deux nombres complexes.

- 1)  $z$  est réel ssi  $Im(z) = 0$ .
- 2)  $z$  est imaginaire pur ssi  $Re(z) = 0$ .
- 3)  $z = 0$  ssi  $Im(z) = Re(z) = 0$ .
- 4)  $z = z' \Leftrightarrow Re(z) = Re(z')$  et  $Im(z) = Im(z')$ .

### Définition : "Conjugué d'un nombre complexe"

Soit  $z = a + ib$  un nombre complexe donné sous forme cartésienne.

On appelle **conjugué** de  $z$  et on note  $\bar{z}$ , le nombre complexe défini par  $\bar{z} = a - ib$ .



### Propriétés :

Soient  $z$  et  $z'$  deux nombres complexes.

- 1)  $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$
- 2)  $\overline{z \cdot z'} = \bar{z} \cdot \bar{z}'$
- 3)  $\overline{(z^n)} = (\bar{z})^n, n \in \mathbb{N}^*$
- 4)  $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}, z' \neq 0$
- 5)  $\overline{\left(\frac{1}{z^n}\right)} = \frac{1}{(\bar{z})^n}, z' \neq 0 \text{ et } n \in \mathbb{Z}$
- 6)  $z + \bar{z} = 2\text{Re}(z)$
- 7)  $z - \bar{z} = 2i \text{Im}(z)$
- 8)  $z \cdot \bar{z} = \text{Re}(z)^2 + \text{Im}(z)^2$
- 9)  $z \text{ est réel} \Leftrightarrow z = \bar{z}$
- 10)  $z \text{ est imaginaire pur} \Leftrightarrow z = -\bar{z}$

### Définition : "Affixe d'un point – Affixe d'un vecteur"

Le plan est muni d'un ROND  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ . Soit  $M(a, b)$  un point du plan.

- On appelle **affixe** de  $M$ , le nombre complexe noté  $\text{aff}(M)$  ou  $z_M$  tel que :  
 $\text{aff}(M) = a + ib$ .

Le nombre complexe  $a + ib$  est dit aussi l'affixe du vecteur  $\overrightarrow{OM}$ , on le note  $\text{aff}(\overrightarrow{OM})$  ou  $z_{\overrightarrow{OM}}$ .

- $M(a, b)$  est le **point image** du nombre complexe  $z = a + ib$ .

### Propriétés :

$A$  et  $B$  sont deux points du plan d'affixes respectives  $z_A$  et  $z_B$ .  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont deux vecteurs.

- 1)  $\text{aff}(\overrightarrow{AB}) = z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$
- 2)  $\text{aff}(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}) = \alpha \text{aff}(\vec{u}) + \beta \text{aff}(\vec{v})$  pour tous réels  $\alpha$  et  $\beta$ .

### Propriétés :

Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont deux vecteurs tels que  $\vec{v} \neq \vec{0}$ .

- 1)  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires  $\Leftrightarrow \frac{z_{\vec{u}}}{z_{\vec{v}}}$  est réel.
- 2)  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux  $\Leftrightarrow \frac{z_{\vec{u}}}{z_{\vec{v}}}$  est imaginaire pur.



### Définition : "Module d'un nombre complexe"

Soit  $z = a + ib$  un nombre complexe donné sous forme cartésienne.

On appelle **module** de  $z$  et on note  $|z|$ , le réel positif défini par  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}$

### Propriétés :

Soient  $z$  et  $z'$  deux nombres complexes.

- |                                    |  |                                      |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1) $ z  = 0 \Leftrightarrow z = 0$ | 4) $ z \cdot z'  =  z  \cdot  z' $                           | 7) $ z + z'  \leq  z  +  z' $        |
| 2) $ -z  =  z $                    | 5) $ z^n  =  z ^n, n \in \mathbb{N}^*$                       | 8) $z\bar{z} =  z ^2$                |
| 3) $ \bar{z}  =  z $               | 6) $\left \frac{z}{z'}\right  = \frac{ z }{ z' }, z' \neq 0$ | 9) $ kz  =  k  z , k \in \mathbb{R}$ |

### Propriété :

Soit A et B deux points d'affixes respectives  $z_A$  et  $z_B$ .

Alors :  $AB = |z_B - z_A|$


### Définition : "Argument d'un nombre complexe"

Le plan est muni d'un ROND  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ .

$z = a + ib$  ( $a$  et  $b$  sont des réels) est un nombre complexe non nul d'image  $M$ .

On appelle **argument** de  $z$  et on note  $\arg(z)$ , toute mesure, en radian, de l'angle orienté  $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$ .

$$\arg(z) \equiv (\vec{u}, \overrightarrow{OM}) [2\pi] \equiv [2\pi]$$



### Propriétés :

Soient  $z$  et  $z'$  deux nombres complexes non nuls.

- 1)  $\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z)[2\pi]$
- 2)  $\arg(-z) \equiv \pi + \arg(z)[2\pi]$
- 3) Si  $k > 0$ , alors  $\arg(kz) \equiv \arg(z)[2\pi]$
- 4) Si  $k < 0$ , alors  $\arg(kz) \equiv \pi + \arg(z)[2\pi]$
- 5)  $\arg(z \cdot z') \equiv \arg(z) + \arg(z')[2\pi]$
- 6)  $\arg(z^n) \equiv n \cdot \arg(z)[2\pi]$
- 7)  $\arg\left(\frac{1}{z}\right) \equiv -\arg(z)[2\pi]$
- 8)  $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z')[2\pi]$



## Théorème :

Soit  $z$  un nombre complexe non nul d'écriture algébrique  $z = a + ib$  et  $\theta$  un argument de  $z$ . Alors :  $a = |z| \cos \theta$  et  $b = |z| \sin \theta$  ou encore :  $\cos \theta = \frac{a}{|z|}$  et  $\sin \theta = \frac{b}{|z|}$

On a alors :  $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$

## Définition : "Forme trigonométrique d'un nombre complexe"

Soit  $z$  un nombre complexe non nul.

L'écriture de  $z$  sous la forme  $|z|(\cos \theta + i \sin \theta)$  ou  $[|z|, \theta]$  où  $\theta$  désigne un argument de  $z$  est appelée **écriture trigonométrique** ou **forme trigonométrique** de  $z$ .

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = [|z|, \theta]$$

$|z|$  et  $\theta$  sont les **coordonnées polaires** du point  $M(z)$ .

## Propriétés :

Le plan est muni d'un ROND  $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ .

$\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont deux vecteurs d'affixes respectives  $z_{\vec{u}}$  et  $z_{\vec{v}}$ .

$$(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) \equiv \arg \left( \frac{z_{\vec{v}}}{z_{\vec{u}}} \right) [2\pi].$$

En particulier, si  $A, B, C$  et  $D$  sont quatre d'affixes respectives  $z_A, z_B, z_C$  et  $z_D$ , alors :

$$(\widehat{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}}) \equiv \arg \left( \frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \right) [2\pi].$$

## Conséquence :

Le plan est muni d'un ROND  $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ .

$$\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} = \frac{CD}{AB} (\cos \theta + i \sin \theta) \text{ avec } (\widehat{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}}) \equiv \theta [2\pi].$$

## Notation :

Pour tout réel  $\theta$ , on note  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ .

## Conséquences :

$$- e^{i0} = 1 ; e^{i\frac{\pi}{2}} = i ; e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i ; e^{i\pi} = -1.$$

$$- \text{Pour tout réel } \theta \text{ et tout entier } k, e^{i\theta} = e^{i(\theta + 2k\pi)}.$$

$$- \text{Pour tout réel } \theta, |e^{i\theta}| = 1 ; \overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} \text{ et } -e^{i\theta} = e^{i(\theta + \pi)}$$

## Propriétés :

Soit  $\theta$  et  $\theta'$  deux réels.

$$e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta + \theta')} ; \frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} ; \frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta - \theta')} ; (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} \text{ pour tout } n \in \mathbb{Z}.$$




### Théorème :

Tout nombre complexe non nul  $z$  s'écrit sous la forme

$z = re^{i\theta}$  où  $r = |z|$  et  $\arg(z) \equiv \theta[2\pi]$ .

L'écriture  $z = re^{i\theta}$  est appelée la **forme exponentielle** de  $z$ .

$$re^{i\theta} = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$



### Théorème :

Pour tout entier naturel  $n \geq 2$ , l'équation  $z^n = 1$  admet dans  $\mathbb{C}$   $n$  solutions distinctes définies par :  $z_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}}$  avec  $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ .

Ces solutions sont appelés les racines  $n^{\text{ièmes}}$  de l'unité.

### Théorème :

Soit  $a$  un nombre complexe non nul d'argument  $\theta$  et un entier naturel  $n \geq 2$ .

L'équation  $z^n = a$  admet dans  $\mathbb{C}$ ,  $n$  solutions distinctes définies par :  $z_k = r e^{i(\frac{\theta+2k\pi}{n})}$  avec  $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$  et  $r$  est le réel strictement positif tel que  $r^n = |a|$ .


Ces solutions sont appelés les racines  $n^{\text{ièmes}}$  du nombre complexe  $a$ .

### Conséquence :

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ .

Lorsque  $n \geq 3$ , les points images des racines  $n^{\text{ièmes}}$  d'un nombre complexe non nul sont les sommets d'un polygone régulier inscrit dans le cercle de centre  $O$  et de rayon  $r$  tel que  $r^n = |a|$ .

Les points images des solutions de l'équation  $z^6 = |a|e^{i\theta}$



### Théorème :

Soit  $(E): az^2 + bz + c = 0$  une équation du second degré à coefficients complexes.

On pose  $\Delta = b^2 - 4ac$ . Appelé le discriminant de l'équation  $(E)$ .

1) Si  $\Delta = 0$ , alors  $(E)$  admet dans  $\mathbb{C}$  une solution double :  $z_1 = z_2 = \frac{-b}{2a}$

2) Si  $\Delta \neq 0$ , alors  $(E)$  admet dans  $\mathbb{C}$  deux solutions distinctes :

$$z_1 = \frac{-b-\delta}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b+\delta}{2a} \text{ avec } \delta \text{ est une racine carrée de } \Delta.$$



### Conséquences :

Soit  $(E): az^2 + bz + c = 0$  une équation du second degré à coefficients complexes.

Si  $z_1$  et  $z_2$  sont les solutions de  $(E)$ , alors :

$$az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2) ; z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \text{ et } z_1 \cdot z_2 = \frac{c}{a}.$$

### Comment déterminer les racines carrées d'un nombre complexe ?

Soit  $Z = a + ib$  et  $z = x + iy$  sont deux nombres complexes donnés sous forme cartésienne. Alors :

$$z \text{ est une racine carrée de } Z \Leftrightarrow z^2 = Z \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \\ 2xy = b \end{cases}$$

### Remarque :

Il est interdit d'utiliser la notation  $\sqrt{\quad}$  pour exprimer une racine carrée d'un nombre complexe, car il ne s'agit pas d'une fonction sur  $\mathbb{C}$ .

### Théorème :

Soit  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$  des nombres complexes tels que  $a_n \neq 0, n \geq 2$ .

Soit  $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ .

Si  $z_0$  est un zéro de  $P$ , alors  $P(z) = (z - z_0)g(z)$ , où  $g(z)$  est de la forme  $a_n z^{n-1} + b_{n-2} z^{n-2} + \dots + b_0$ , avec  $b_0, b_1, b_2, \dots, b_{n-2}$  sont des nombres complexes.

### Formules d'Euler :

$$\text{Pour tout réel } \theta \text{ on a : } \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} = \cos \theta \text{ et } \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} = \sin \theta$$

### Formule de Moivre :

$$\text{Pour tout } \theta \in \mathbb{R} \text{ et pour tout } n \in \mathbb{Z} \text{ on a : } (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

### Remarque :

En transformant une expression contenant une puissance de  $\cos x$  ou de  $\sin x$  sous une forme qui ne contient aucun produit de fonctions circulaires, on dit qu'on a **linéarisé** l'expression donnée.

