

**Le devoir dure 3 heures. Les calculatrices sont autorisées, mais :
l'échange de tout matériel est interdit**
Les brouillons ne sont pas acceptés dans les copies. Une copie non soignée sera sanctionnée.
Le sujet comporte 3 pages numérotées de 1 à 3.

EXERCICE 1 (3 points). Répondre par VRAI ou FAUX (Aucune justification n'est demandée).

- 1– Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
- 2– Si f est continue en 1 alors f est dérivable en 1.
- 3– Si f est paire et si f est dérivable à droite en 0, alors elle est dérivable en 0.
- 4– ABC est un triangle rectangle en A . La transformation $\tau_{\overrightarrow{AB}} \circ S_{(AC)}$ est une symétrie glissante.

EXERCICE 2 (5 points). ABC est un triangle équilatéral de centre O .

- 1– Montrer qu'il existe une unique isométrie φ qui envoie A, B et C respectivement en B, C et A
- 2– a– Montrer que $\varphi(O) = O$.
b– Déterminer les images de C, O et A par $S_{BO} \circ \varphi$. Identifier l'application $S_{BO} \circ \varphi$.
c– Déduire la nature et les éléments caractéristiques de φ .
- 3– M et M' sont deux points variables respectivement sur les segments $[AB]$ et $[BC]$ tels que $AM = BM'$.
Montrer que la médiatrice du segment $[MM']$ passe par un point fixe que l'on précisera.
- 4– Déterminer l'isométrie ψ telle que l'application $\varphi \circ \psi$ envoie B en B , A en C et C en A .

EXERCICE 3 (6 points). . .

- 1– Pour tous réels x et a de $[0, \frac{\pi}{2}]$ tel que $a > 0$, on pose :

$$g(x) = \sin x - x - x^3 \left(\frac{\sin a - a}{a^3} \right)$$

- (a) Montrer qu'il existe $c \in]0, a[$ tel que $g'(c) = 0$.

- (b) On pose $\theta = \frac{c}{a}$. Montrer que $a - \sin a = \frac{a^3}{3} \times \frac{1 - \cos(a\theta)}{(a\theta)^2}$.

(c) Dédurre les résultats suivants :

(1) Pour tout $a \in]0, \frac{\pi}{2}]$, $\sin a < a$.

(2) $\lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{a - \sin a}{a^3} = \frac{1}{6}$.

2— On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0, \frac{\pi}{2}]$ par :

$$f(x) = \frac{1}{x} - \frac{\cos x}{\sin x} \text{ si } x \in]0, \frac{\pi}{2}[\text{ et } f(0) = 0.$$

(a) Montrer que pour tout réel $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$, on a :

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x}{\sin x} \times \left(\frac{\sin x - x}{x^3} + \frac{1 - \cos x}{x^2} \right).$$

(b) Dédurre que f est dérivable à droite en 0.

(c) Montrer que pour tout réel $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$, $f'(x) = \frac{1}{\sin 2x} - \frac{1}{x^2}$

(d) Étudier les variations de f puis dresser son tableau de variation.

EXERCICE 4 (6 points). . Pour tout réel $X \in \mathbb{R}$, on pose $P(X) = X^3 + X$. On donne dans la **figure 1** (voir feuille annexe) la courbe Γ représentative de la fonction P .

1— (a) Montrer que P est strictement croissante sur \mathbb{R} .

(b) Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, l'équation $P(X) = n$ possède une solution unique α_n dans l'intervalle $]0, \sqrt{n}[$.

(c) Placer sur l'axe des abscisses les solutions α_1 , et α_3 .

(d) A l'aide du graphique donner un encadrement d'amplitude 10^{-1} de α_3 .

2— n étant un entier strictement positif.

(a) Vérifier que : $P(\alpha_{n+1}) = P(\alpha_n) + 1$

(b) Dédurre que la suite (α_n) est croissante.

3— Montrer que pour tout $n \geq 1$, $(\alpha_n)^2 \geq \sqrt{n} - 1$ puis déduire la limite de α_n lorsque n tend vers $+\infty$.

4— (a) Montrer que pour tout $n \geq 1$, on a : $\frac{1}{P'(\alpha_{n+1})} \leq \alpha_{n+1} - \alpha_n \leq \frac{1}{P'(\alpha_n)}$.

(b) Pour tout $n \geq 2$, on note B_n le point de Γ d'abscisse α_n et soit H_n le projeté orthogonal de B_n sur l'axe des abscisses. On note β_n l'aire du triangle $OH_n B_n$.

Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\beta_{n+1}}{\beta_n} = 1$

FEUILLE ANNEX (1) À RENDRE

Nom :

Prénom :




Figure 1