



EXERCICE N° 01

Cocher la réponse juste

❖ La fonction $x \mapsto \sin(x^2)$ est dérivable sur \mathbb{R} et sa dérivée est :

- A $x \mapsto \cos(x^2)$
 B $x \mapsto 2x \cos(x^2)$
 C $x \mapsto \cos(2x)$

❖ On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $u_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n E(k)$; E est la fonction partie entière, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n =$

- A $+\infty$
 B $\frac{1}{2}$
 C 0

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct (O, \vec{u}, \vec{v})


❖ Soit $\Omega(1-i)$. L'ensemble des points M d'affixe $z = x + iy$ tel que $|z - 1 + i| = |3 - 4i|$ à pour équation :

- A $y = -x + 1$
 B $(x-1)^2 + y^2 = \sqrt{5}$
 C $z = 1 - i + 5e^i ; \theta \in \mathbb{R}$

❖ Les points $A(a), B(b), C(c), D(d)$ et $E(e)$ sont sur le cercle de diamètre $[AB]$, alors on a :

- A $a + b = 0$
 B $\frac{b-c}{a-c} \in i\mathbb{R}$
 C $\arg\left(\frac{b-a}{e-a}\right) \equiv \arg\left(\frac{e-c}{b-c}\right) [2\pi]$
 D $c - e = \bar{d} - \bar{a}$
 E $a + c + d + e = 1$

π



EXERCICE N° 02

On considère l'équation :

$$(E): z^2 - (1+i)[1 + \tan(\theta)]z + i[1 + \tan^2(\theta)] = 0 \quad ; \quad \theta \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$$

1- a) Calculer $(1-i)^2 [1 - \tan(\theta)]^2$.

b) Résoudre dans \mathbb{C} l'équation (E)

2- Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct (O, \vec{u}, \vec{v}) , on considère les points $M_1(z_1)$ et $M_2(z_2)$ avec $z_1 = 1 + i \tan(\theta)$ et $z_2 = i + \tan(\theta)$; $\theta \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$

a) Déterminer la forme exponentielle de z_1 et de z_2

b) Montrer que $OM_1 = OM_2$ et déterminer $(\overrightarrow{OM_1}, \overrightarrow{OM_2})$

c) Déterminer θ pour que le triangle OM_1M_2 soit équilatéral.

EXERCICE N° 03

La graphe ci contre est la représentation graphique d'une fonction f définie et continue sur \mathbb{R} . L'axe des abscisses est une asymptote à (\mathcal{C}_f) au voisinage de $+\infty$

Soit g la fonction définie sur \mathbb{R} par $g(x) = \frac{1}{f(x)}$

1- Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g \circ f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g \circ f(x)$.

2- Déterminer $g \circ f([0, 2])$



3- Montrer que l'équation $g \circ f(x) = 1$ admet une unique solution dans \mathbb{R} .



EXERCICE N° 04

Soit h la fonction définie sur \mathbb{R} par $h(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$.

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = h(u_n) \end{cases}; \forall n \in \mathbb{N}$

1- Montrer que $\forall x > 0$, on a : $0 < h(x) < x$

2- a) Montrer que $u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$

b) Etudier la monotonie de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et calculer sa limite.

3- a) Exprimer pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2}$ en fonction de u_n^2

b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a : $\frac{1}{u_n^2} = 2n + 1 + \sum_{k=0}^{n-1} u_k^2$

c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a : $u_n \leq \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$. Retrouver $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

4- a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, on a : $h(x) \geq x - \frac{x^2}{2}$

b) On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = h\left(\frac{1}{n^2}\right) + h\left(\frac{2}{n^2}\right) + h\left(\frac{3}{n^2}\right) + \dots + h\left(\frac{n}{n^2}\right)$

Prouver que $\frac{n+1}{2n} - \frac{(n+1)(2n+1)}{12n^3} \leq S_n \leq \frac{n+1}{2n}$ (on donne $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$)

c) Montrer que S_n est convergente et calculer sa limite.

EXERCICE N° 05

Soit φ la fonction définie sur \mathbb{R} par : $\varphi(x) = \begin{cases} x + \sin(\pi x^2) & \text{si } x < 0 \\ \frac{2x^2 - x}{2 - x} & \text{si } x \in [0, 1] \\ 2 - x + \sqrt{x^2 - 1} & \text{si } x > 1 \end{cases}$

1- Montrer que φ est continue sur \mathbb{R} .

2- a) Montrer que pour tout $x < 0$, on a : $x - 1 \leq \varphi(x) \leq x + 1$

b) En déduire $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\varphi(x)}{x}$

3- a) Montrer que l'équation $\varphi(x) = \frac{1}{2}$ admet une unique solution $\alpha \in \left] \frac{3}{4}, 1 \right[$

b) Donner un encadrement de α à 125×10^{-3} près.

Bon Travail.....

