

EXERCICE N : 3 (5 points)

Soit la suite réelle (U_n) définie sur \mathbb{N} par :

$$\begin{cases} U_0 = 4 \\ U_{n+1} = \frac{U_n^2 + 4}{2U_n} \end{cases}$$

1) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $U_n > 2$.

2) a) Montrer que la suite (U_n) est décroissante sur \mathbb{N} .

b) Dédurre que (U_n) est convergente et calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

3) Soit la suite (V_n) définie sur \mathbb{N} par : $V_n = \ln\left(\frac{U_n - 2}{U_n + 2}\right)$.

a) Montrer que (V_n) est une suite géométrique de raison $q = 2$.

b) Exprimer (V_n) en fonction de n puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n$.

c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$; $U_n = \frac{2(e^{V_n} + 1)}{1 - e^{V_n}}$.

EXERCICE N : 4 (7 points)

A) Soit la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = x^2 - 2 + \ln x$.

1) a) Dresser le tableau de variations de g .

b) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet dans $]0; +\infty[$ une unique solution α .

c) Vérifier que $1,3 < \alpha < 1,4$.

2) Déterminer le signe de $g(x)$ sur $]0; +\infty[$.

B) Soit la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{x^2 + 1 - \ln x}{x}$.

On désigne par (Cf) la courbe représentative de f dans le repère orthonormé $R(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1) a) Montrer que pour tout $x \in]0; +\infty[$; $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

b) Montrer que $f(\alpha) = 2\alpha - \frac{1}{\alpha}$.

c) Etudier les variations de f sur $]0; +\infty[$.

2) a) Montrer que la droite $\Delta : y = x$ est une asymptote à (Cf) .

b) Etudier la position relative de (Cf) par rapport à Δ .

3) Tracer Δ et (Cf) . (On prend : $\alpha = 1,3$)

4) Déterminer la primitive F de h sur $]0; +\infty[$ tel que : $H(e) = \frac{1}{2}$.

