

## DEVOIR DE SYNTHESE N°1

Niveau : 4<sup>ème</sup> année sciences expérimentales 1 & 2

 MATHÉMATIQUES

 2 heures 

Lycée Radhia  
Hadded

 ANIS BEN ALI

 Décembre 2019


*Le sujet comporte des pages numérotées de (1 sur 4) à (4 sur 4). La page (4 sur 4) est à rendre avec la copie*

### EXERCICE N°1 : (7 points)

Soit  $f$  une fonction définie, continue et deux fois dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

Dans le graphique ci-dessous, on a représenté dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  les courbes  $(C)$  et  $(C')$  de la fonction  $f$  et celle de sa dérivée  $f'$ .

- Les droites  $y = -1$  et  $y = 3$  sont des asymptotes de  $(C)$  et la droite  $y = 0$  est une asymptote de  $(C')$ .
- La courbe  $(C)$  n'admet aucune tangente horizontale et la courbe  $(C')$  admet une seule tangente horizontale.
- Le point  $I\left(1, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$  appartenant à  $(C')$ .



I) Utiliser le graphique pour répondre.

1) a) Justifier que  $(C)$  est la courbe de  $f$ .

b) Montrer que le point  $A(0,1)$  est un point d'inflexion de  $(C)$ .

c) Donner une équation de la tangente  $(T)$  à  $(C)$  en  $A$ .

d) Tracer  $(T)$  dans l'annexe 1 de la page 4.

e) Justifier que pour tout  $x \in [1,3]$ ,  $f'(x) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

2) Montrer que l'équation  $f(x) = x$  admet une solution unique  $\alpha \in [2,3]$ .

II) La fonction  $f$  est définie par  $f(x) = 1 + \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}$  et dont on a représenté la restriction à l'intervalle  $[0, \alpha]$  ainsi que la droite  $\Delta : y = x$ . On considère la suite  $(u_n)$  définie sur  $\mathbb{N}$  par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 1 + \frac{2u_n}{\sqrt{1+u_n^2}} = f(u_n); n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

- 1) Représenter dans l'**annexe 2** (page 4) les trois premiers termes de la suite  $u$  et conjecturer quant à la monotonie de cette suite.
- 2) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $1 \leq u_n \leq \alpha$ .
- 3) En utilisant la position de (C) par rapport à  $\Delta$ , montrer que  $(u_n)$  est croissante.
- 4) En déduire que  $(u_n)$  est convergente et déterminer sa limite.
- 5) a) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} |u_n - \alpha|$ .  
b) En déduire que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $|u_n - \alpha| \leq 2 \left( \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n$ .  
c) Retrouver la limite de  $(u_n)$ .  
d) A l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier naturel  $p$  tel que  $|u_p - \alpha| \leq 10^{-2}$ .  
(On rappelle que  $u_p$  est une valeur approchée de  $\alpha$  à  $10^{-2}$  près)

### EXERCICE N°2 : (6.5 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ .

Soit  $m$  un nombre complexe de module 1 et tel que  $\arg m \equiv \theta[2\pi]$  où  $\theta \in ]-\pi; \pi]$ .

1°) On considère, dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $(E_m) : \overline{m}z^2 - (1 + \overline{m})z + 2(1 - m) = 0$

- a) Montrer que le discriminant  $\Delta_m$  de l'équation  $(E_m)$  est égal à  $(\overline{m} - 3)^2$ .
- b) Résoudre l'équation  $(E_m)$ .

(on notera  $Z_1$  la solution de module 2 et  $Z_2$  l'autre solution) puis vérifier que  $Z_1 = 2m$  et  $Z_2 = 1 - m$ .

2°) On considère le point  $M$  d'affixe  $Z_1$ . Quel est l'ensemble des points  $M$  lorsque  $\theta$  décrit  $]-\pi; \pi]$ .

3°) Dans cette question, on prendra  $m = e^{i\frac{3\pi}{4}}$

a) Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $(E')$  :  $z^3 = Z_1 = 2e^{i\frac{3\pi}{4}}$ .

b) On a tracé sur le graphique au-dessous la courbe  $\Gamma : y = x^3$  pour  $x \geq 0$ .

Construire alors, sur le même graphique (**l'annexe 3**), les points images de toutes les solutions de  $(E')$ .

4°) Dans cette question, on prendra  $m = e^{i\frac{\pi}{3}}$

a) Vérifier que  $Z_2 = e^{-i\frac{\pi}{3}}$ .

b) Résoudre alors dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $(E'') : e^{-i\frac{\pi}{3}}z^4 - \left(1 + e^{-i\frac{\pi}{3}}\right)z^2 + 2\left(1 - e^{i\frac{\pi}{3}}\right) = 0$ .

c) Vérifier que les images des solutions de  $(E'')$  sont les sommets d'un parallélogramme.

**EXERCICE N°3 : (3.5 points)**

On considère les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  définies par  $u_0 = 2019$  et  $v_0 = 2021$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$u_{n+1} = \frac{1}{3}(2u_n + v_n) \text{ et } v_{n+1} = \frac{1}{3}(u_n + 2v_n).$$

1°) a) Montrer que la suite  $w_n = v_n - u_n$  est géométrique.

b) En déduire que  $v_n \geq u_n$ .

c) Montrer que les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  convergent vers la même limite  $\ell$ .

2°) a) Montrer que la suite  $t_n = u_n + v_n$  est constante.

b) En déduire la valeur de  $\ell$ .

**EXERCICE N°4 : (3 points)**

Soit  $f$  une fonction dérivable sur  $[-4, 6]$  et telle que sa dérivée  $f'$  est continue sur  $[-4, 6]$ .

On donne le tableau de variation de sa **fonction dérivée**.

$x$	-4	0	2	6
$f'(x)$	-3	-5	4	-1

Diagramme de variation de la dérivée  $f'$  :  
 - À  $x = -4$ ,  $f' = -3$ .  
 - Une flèche descendante mène à  $x = 0$ ,  $f' = -5$ .  
 - Une flèche ascendante mène à  $x = 2$ ,  $f' = 4$ .  
 - Une flèche descendante mène à  $x = 6$ ,  $f' = -1$ .


Répondre par vrai ou faux aux questions suivantes en justifiant la réponse

1°) Il existe exactement une tangente à  $(C_f)$  parallèle à la droite  $y = -2x$ .


2°) Il existe une unique tangente horizontale à  $(C_f)$

3°) On a  $-10 \leq f(2) - f(0) \leq 8$ .


4°) La suite  $U$  définie sur  $\mathbb{N}^*$  par  $U_n = f'\left(\frac{1}{n}\right)$  est croissante.



l'annexe 1



l'annexe 2



l'annexe 3