

# Sujet n°2

## **EXERCICE 1 : (Bac 2017)**

A/1) a) Justifier que  $(\sqrt{2})^3 = 2\sqrt{2}$ .

b) Déterminer les racines cubiques du nombre complexe  $2\sqrt{2}i$ .

2) Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ .

Dans la **figure** de l'annexe ci-jointe :

- (C) est le cercle de centre O et de rayon  $\sqrt{2}$ .

- A et D sont les points d'affixes respectives  $z_A = -\sqrt{2}i$  et  $z_D = 2\sqrt{2}i$ .

a) Construire dans l'annexe les points B et C d'affixes respectives

$$z_B = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{6}} \text{ et } z_C = \sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{6}}.$$

b) Vérifier que  $z_B = \frac{\sqrt{6}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$  et que  $z_C = -\frac{\sqrt{6}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$ .

c) Montrer que  $(BC) \perp (AD)$ .

d) Montrer que le quadrilatère ABDC est un losange.

B/ Soit  $\alpha$  un nombre complexe non nul. On désigne par M, N et P les points d'affixes respectives  $z_M = \alpha$ ,  $z_N = \alpha e^{i\frac{2\pi}{3}}$  et  $z_P = \alpha e^{i(-\frac{2\pi}{3})}$ .

1) a) Calculer  $z_N^3$  et  $z_P^3$ .

b) En déduire la nature du triangle MNP.

2) Soit Q le point d'affixe  $z_Q = \alpha^3$ .

a) Montrer que

(le quadrilatère MNQP est un losange) équivaut à  $(\alpha^3 = -2\alpha)$ .

b) Déterminer les valeurs de  $\alpha$  pour lesquelles MNQP est un losange.

## **EXERCICE 2 :**

Pour tout réel  $\theta \in ]0, \pi[$  on considère l'équation  $(E_\theta): z^2 - 2z - 2i \sin \theta e^{i\theta} = 0$

1) a) Montrer que :  $1 + 2i \sin \theta e^{i\theta} = (e^{i\theta})^2$

b) Résoudre dans  $\mathbb{C}$ ,  $(E_\theta)$



2) On donne  $f(z) = z^3 - 4z^2 + (4 - 2i \sin \theta e^{i\theta})z + 4i \sin \theta e^{i\theta}$

a) Calculer  $f(2)$

b) Montrer que  $f(z) = (z-2)(z^2 + bz + c)$  ou  $b$  et  $c$  deux nombres complexes à déterminer.

c) Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $f(z) = 0$

3) Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct  $(o, \vec{u}, \vec{v})$ . On désigne par

$A, B,$  et  $C$  les points d'affixes  $2, 1 - e^{i\theta}$  et  $1 + e^{i\theta}$

a) Donner la forme exponentielle de  $z_B$  et  $z_C$


b) Montrer que  $OABC$  est un rectangle

c) Déterminer  $\theta$  pour que  $OABC$  soit un carré

### **EXERCICE 3 :**

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct  $(A, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ , on considère le parallélépipède

rectangle  $ABCDEFGH$  tel que :  $\vec{AB} = 2\vec{i}$ ,  $\vec{AD} = 3\vec{j}$ ,  $\vec{AE} = 4\vec{k}$ .



1) Le produit vectoriel  $\vec{AB} \wedge \vec{AE}$  est égal à :

- a)  $-8\vec{k}$                       b)  $-8\vec{i}$                       c)  $-8\vec{j}$

2) Soit  $P$  le plan  $(FHC)$ . La droite  $(BD)$  est :

- a) Strictement parallèle à  $P$                       b) Perpendiculaire à  $P$                       c) Contenue dans  $P$

3) Le produit mixte  $(\vec{BC}, \vec{AB}, \vec{EG})$  est égal à :

- a) 0                                      b) -24                                      c) 24

4) L'intersection de la sphère  $S$  de centre  $A$  et de rayon 4 avec le plan  $Q$  d'équation cartésienne  $y = 3$  est le cercle :

- a) de centre  $C$  et de rayon  $\sqrt{7}$ .                      b) de centre  $D$  et de rayon  $\sqrt{7}$ .                      c) de centre  $D$  et de rayon 4.


### **EXERCICE 4 :**

L'espace étant muni d'un repère orthonormé direct  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ . On considère les points  $A(2,0,0)$ ,  $B(0,4,0)$  et  $C(0,0,4)$  et on désigne par  $I$  et  $J$  les milieux respectifs des segments  $[AB]$  et  $[BC]$ .

1) Déterminer les coordonnées des points  $I$  et  $J$ .

2) Soit  $P$  l'ensemble des points  $M$  de l'espace vérifiant  $MI = MJ$

a) Identifier le plan  $P$  et montrer qu'il a pour équation :  $2x - 4z + 3 = 0$



- b) Déterminer les coordonnées des points d'intersection du plan P avec les axes  $(O, \vec{i})$ ,  $(O, \vec{j})$  et  $(O, \vec{k})$ .
- 3) a) Calculer le volume  $V$  du tétraèdre OABC puis l'aire du triangle ABC.  
b) En déduire la distance du point O au plan (ABC).
- 4) On désigne par  $v$  le volume du tétraèdre OIBJ.  
Sans calculer  $v$ , montrer que  $V = 4.v$

## **EXERCICE 5 : (Bac 2017)**

Soient  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (1+x^2)e^{-x}$  et  $(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthogonal  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

- 1) a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .  
b) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$  et interpréter graphiquement le résultat.  
c) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  et interpréter graphiquement le résultat.
- 2) a) Montrer que pour tout réel  $x$ ,  $f'(x) = -(x-1)^2 e^{-x}$ .  
b) Dresser le tableau de variation de  $f$ .
- 3) a) Déterminer une équation cartésienne de la tangente à  $(C)$  au point J d'abscisse 0.  
b) Soient A et B les points de  $(C)$  d'abscisses respectives 1 et 3.  
Montrer que A et B sont deux points d'inflexion de  $(C)$ .
- 4) Dans la **figure 2** de l'annexe ci-jointe :  
-  $(\Gamma)$  est la courbe représentative dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  de la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = e^x$ .  
- E et F sont les points de  $(\Gamma)$  d'abscisses respectives  $(-1)$  et  $\ln 10 - 3$ .  
- G est le point de coordonnées  $(0, 1 - 6e^{-3})$ .  
a) Exprimer  $f(1)$  en fonction de  $g(-1)$  et  $f(3)$  en fonction de  $g(-3)$ .  
b) En remarquant que  $10 g(-3) = g(\ln 10 - 3)$ , placer les points A et B dans l'annexe.
- 5) a) Soit K le point de coordonnées  $(\frac{11}{2}, 0)$ .  
Montrer que la droite (BK) est la tangente à la courbe  $(C)$  au point B.  
b) Tracer la courbe  $(C)$  dans l'annexe (On placera les tangentes à  $(C)$  en A, en J et en B).
- 6) Soit S l'aire en (u.a) de la partie E du plan limitée par la courbe  $(C)$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations cartésiennes  $x = 0$  et  $x = 3$ .  
a) Hachurer E.  
b) Soit F la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $F(x) = -(x^2 + 2x + 3)e^{-x}$ .  
Montrer que F est une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .



c) Calculer  $S$ .

d) Vérifier que la valeur moyenne de  $f$  sur l'intervalle  $[0,3]$  est égale à  $1 - 6e^{-3}$ .

e) Tracer dans la **figure 2** un rectangle d'aire égale à  $S$ .

Figure 2

