

EXERCICE 1 :

On a représenté ci-dessous dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) la courbe (C) d'une fonction f solution de l'équation différentielle $(E): y' + y = e^{-x}$ et sa tangente au point d'abscisse (-1)

- La courbe (C) admet une branche parabolique de direction (O, \vec{j}) au voisinage de $-\infty$
- L'axe des abscisses est une asymptote à la courbe (C)

1) Par lecture graphique déterminer


a) $f(0)$ et $f'(-1)$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$

2) a) Montrer que $f'(0) = -1$

b) En déduire une équation de la tangente à (C) point d'abscisse 0

3) a) Montrer que $f(-1) = e$



b) Calculer l'aire de la partie du plan limitée par la courbe (C) l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 0$

4) a) Montrer que la fonction $u(x) = xe^{-x}$ est une solution de (E) .

b) Résoudre l'équation différentielle $(E_0): y' + y = 0$

c) Montrer qu'une fonction g dérivable sur \mathbb{R} est solution de (E) si et seulement si $g - u$ est solution de (E_0) . En déduire toutes les solutions de (E) .

d) Déterminer alors la fonction f

EXERCICE 2 :

I/ Soit l'équation différentielle $(E) : (e^{2x} - 1)y' + e^{2x}y = 0$.

1) Vérifier que $\forall k \in \mathbb{R}$ la fonction $u : x \mapsto \frac{k}{\sqrt{e^{2x}-1}}$ est une solution de (E) sur $]0, +\infty[$.

2) Montrer que si y est une solution de l'équation (E) , alors $Z = (e^{2x} - 1)y^2$ est constante sur \mathbb{R} .

3) En déduire la fonction positive f définie sur $]0, +\infty[$ qui vérifie l'équation (E) et telle que $f(\ln\sqrt{2}) = 1$

II/ Dans toute la suite la fonction f est définie sur $]0, +\infty[$ par : $f(x) = \frac{1}{\sqrt{e^{2x}-1}}$

1) a) Montrer que f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $]0, +\infty[$.

b) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in]0, +\infty[$.

c) Tracer la courbe Γ de f dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) .



- 2) Soit h la fonction définie sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ par : $h(x) = \frac{1}{2} \ln(1 + \tan^2 x)$
- Montrer que h réalise une bijection de $]0, \frac{\pi}{2}[$ sur $]0, +\infty[$.
 - Montrer que h^{-1} est dérivable sur $]0, +\infty[$ et que $(h^{-1})'(x) = f(x)$
 - Pour tout $\lambda > \ln(\sqrt{2})$ on désigne par \mathcal{A}_λ l'aire de la partie du plan limitée par la courbe Γ et les droites d'équations : $x = \ln(\sqrt{2})$, $x = \lambda$ et $y = 0$.
Montrer que $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}_\lambda = \frac{\pi}{4}$
- 3) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \int_{\ln(\sqrt{2})}^1 \frac{dx}{\sqrt{e^{2nx} - 1}}$
- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \geq 0$
 - Montrer que (u_n) est décroissante et déduire qu'elle est convergente.
 - Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \leq \frac{1}{\sqrt{2n-1}}$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

EXERCICE 3 :

Dans le graphique ci-contre on a tracé la courbe (C) de la fonction f' dérivée de la fonction f définie sur $[0, +\infty[$ par :

$$f(x) = -x(a + b \ln x)^2 \quad \text{où } a \text{ et } b \text{ sont deux réels}$$

$$f(0) = 0$$

tels que $a > 0$ et $b < 0$.

On admet que $f(\frac{1}{e}) = -\frac{4}{e}$ et $f(e) = 0$

- En utilisant l'égalité : $x \cdot \ln^2 x = (\sqrt{x} \ln x)^2$ pour tout $x > 0$, calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln^2 x$
 - En déduire que f est continue à droite en 0
- A l'aide du graphique :
 - Dresser le tableau de variation de la fonction f .
 - Déterminer $f'(1)$ et $f''(1)$.
 - Montrer que le point A(1, -1) est un point d'inflexion de (C) (la courbe de f selon un repère orthonormé (O, \vec{u}, \vec{v})).
- En se servant des valeurs de $f(\frac{1}{e})$ et $f(e)$, montrer que : $a = 1$ et $b = -1$.
- Calculer en (u.a) l'aire \mathcal{A} de la partie du plan limitée par (C'), l'axe (O, \vec{i}) et les droites d'équations : $x = \frac{1}{e}$ et $x = e^2$.
- Montrer que (C) admet au point O(0,0) une demi tangente verticale.
 - Etudier la branche infinie de (C) au voisinage de $+\infty$.
 - Résoudre dans \mathbb{R} l'équation $f(x) = -x$ puis tracer (C) et la droite D : $y = -x$.
- Calculer en (u.a) l'aire \mathcal{A}' de la partie du plan limitée par (C), la droite D et les droites d'équations $x = 0$ et $x = e^2$.

