

EXERCICE 6:

Calculer (au moyen d'une primitive) chacune des intégrales suivantes :

$$\int_0^{\ln 2} (e^{4x} + 2e^{-x}) dx \quad ; \quad \int_0^1 x^2 e^{(x^3+1)} dx \quad ; \quad \int_1^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx \quad ; \quad \int_0^{\ln 2} \frac{e^{-2x}}{1+e^{-2x}} dx$$

EXERCICE 7:

Soit La fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ par : $f(x) = \ln(1 + e^{\frac{1}{x}})$

- 1) Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ et que : $f'(x) = \frac{-e^{\frac{1}{x}}}{x^2(1+e^{\frac{1}{x}})}$
- 2) a) Montrer que f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $] \ln 2, +\infty[$
b) Montrer que $f^{-1}(x) = \frac{1}{\ln(e^x - 1)} \quad \forall x \in] \ln 2, +\infty[.$


EXERCICE 8:

Dans la figure ci-contre, on a représenté dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) la courbe (C') de la fonction f' dérivée de la fonction f définie sur \mathbb{R} par

$$f(x) = (ax + b)^2 \cdot e^x, \text{ où } a > 0 \text{ et } b < 0.$$

La courbe (C') admet une asymptote

d'équation : $y = 0$ au voisinage de $(-\infty)$ et une branche parabolique au voisinage de $(+\infty)$ de direction celle de l'axe (O, \vec{j}) .



I/ 1) A l'aide des valeurs graphiques de $f'(0)$ et $f'(-1)$, montrer que $a = 1$ et $b = -1$

2) Par une lecture graphique :

- a) Dresser le tableau de variation de f
- b) Montrer que la courbe (C) de f admet deux points d'inflexion A et B.

II/ 1) Prouver que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$. En déduire une interprétation géométrique.

2) Vérifier que $f(x) - f'(x) = (2 - 2x)e^x$. En déduire la position de (C) par rapport à (C') .

3) Tracer (C) dans le même repère (O, \vec{i}, \vec{j}) . (On prend $\alpha = -1 - \sqrt{2}$ et $\beta = -1 + \sqrt{2}$)

III/ 1) Calculer en $(u.a)$ l'aire \mathcal{A} de la partie du plan limitée par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -2$ et $x = 1$.

2) Calculer en $(u.a)$ l'aire \mathcal{A}' de la partie du plan limitée par les courbes (C) , (C') et les droites d'équations $x = -2$ et $x = 1$.

EXERCICE 9:

Soit la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = \frac{4e^x}{e^x + 1}$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) . (On prend comme unité graphique 1cm)

- 1) Etablir le tableau de variation de f .
- 2) a) Montrer que le point $I(0,2)$ est un centre de symétrie de (C) .
b) Ecrire une équation de la tangente T à (C) au point I .
- 3) a) Vérifier que $(e^x + 1)^2 \geq 4e^x$. En déduire que $f'(x) \leq 1$
b) Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution α dans \mathbb{R} et que $\alpha < 1$
- 4) Tracer $\Delta : y = x$, (C) et T .

