

Les équations à coefficients complexes

Séance 4

EXERCICE 1:

1) Déterminer les racines carrées de chacun des complexes suivants :

$$-16, \quad -2, \quad 2i, \quad \sqrt{3} + i, \quad 3 + 4i, \quad i.e^{i\frac{5\pi}{6}}$$

- 2) a) Déterminer les racines quatrièmes puis les racines sixièmes du nombre complexe $z = -32 + i.32\sqrt{3}$
b) Représenter alors dans chacun des deux cas les images des solutions sur le cercle de centre O dont on précisera le rayon.

EXERCICE 2:

- 1) a) Calculer $(2 + i)^2$
b) Résoudre dans \mathbb{C} l'équation (E) : $z^2 - 3(2 + i)z + 2(3 + 4i) = 0$
- 2) Soit l'équation (E') : $z^3 - 2(3 + 2i)z^2 + (3 + 14i)z + 8 - 6i = 0$
a) Montrer que l'équation (E') admet dans \mathbb{C} une solution imaginaire pure z_1 .
b) Soit le polynôme $P(z) = z^3 - 2(3 + 2i)z^2 + (3 + 14i)z + 8 - 6i$
Déterminer les complexes a, b et c tels que : $P(z) = (z - z_1)(az^2 + bz + c)$
c) Résoudre dans \mathbb{C} l'équation (E').

EXERCICE 3:

Soit l'équation (E) : $z^2 + 2(\sqrt{3} + i)z + 8 + 8\sqrt{3}i = 0$

On désigne par z_1 et z_2 les deux solutions de l'équation (E).

- 1) a) Sans calculer z_1 et z_2 vérifier que $|z_1 \cdot z_2| = 16$ et $\arg(z_1 \times z_2) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$
b) Vérifier que $z_1 = -4i$ est une solution de (E).
c) En déduire l'écriture exponentielle de z_2 .
- 2) Résoudre alors dans \mathbb{C} l'équation (E') : $z^4 + 2(\sqrt{3} + i)z^2 + 8 + 8\sqrt{3}i = 0$

EXERCICE 4:

1) On considère l'équation (E) : $z^2 - 2e^{i\frac{\pi}{5}}z + e^{i\frac{2\pi}{5}} - 1 = 0$

Résoudre dans \mathbb{C} l'équation (E).

- 2) Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct (O, \vec{u}, \vec{v}) , on donne les points A, B et C d'affixes respectifs $z_A = 2e^{i\frac{\pi}{5}}$, $z_B = 1 + e^{i\frac{\pi}{5}}$ et $z_C = -1 + e^{i\frac{\pi}{5}}$
a) Montrer que $z_B = 2\cos\left(\frac{\pi}{10}\right) \cdot e^{i\frac{\pi}{10}}$ et que $z_C = 2\sin\left(\frac{\pi}{10}\right) \cdot e^{i\frac{3\pi}{5}}$
b) Montrer que le quadrilatère OBAC est un rectangle.

EXERCICE 5:

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct (O, \vec{u}, \vec{v}) . Pour tout réel $\theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, on considère

dans \mathbb{C} l'équation : $(E_\theta) : z^3 - (3 + 2i \sin 2\theta)z^2 + (2 + 4i \sin 2\theta)z - 2i \sin 2\theta = 0$

- 1) a) Vérifier que 1 est une solution de (E_θ)
a) Résoudre dans \mathbb{C} , l'équation (E_θ) .



- 2) On considère les points A, M et N d'affixes respectives $z_0=1$, $z_1=1+e^{i2\theta}$ et $z_2=1-e^{-i2\theta}$
- a) Déterminer l'ensemble décrit par les points M lorsque θ décrit $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.
- b) Déterminer l'ensemble décrit par les points N lorsque θ décrit $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.
- 3) Mettre z_1 et z_2 sous forme exponentielle.
- 4) a) Montrer que le triangle AMN est isocèle en A.
b) Déterminer θ pour que le triangle AMN soit équilatéral.

EXERCICE 6:

- 1) a) Résoudre dans \mathbb{C} l'équation : $z^2 - (1+i)z + i = 0$
b) En déduire les solutions dans \mathbb{C} de l'équation $\frac{e^{i\frac{2\pi}{3}}}{z^2} - (1+i)\frac{e^{i\frac{\pi}{3}}}{z} + i = 0$
- 2) θ étant un réel de $]0, \frac{\pi}{2}[$. On considère l'équation (E) : $z^2 - 2e^{i\theta}\cos\theta z + e^{2i\theta} = 0$
- a) Montrer que $(2i \cdot \sin\theta \cdot e^{i\theta})^2 = 4e^{i2\theta}\cos^2\theta - 4e^{i2\theta}$
b) Montrer que $2i \cdot e^{i\theta}\sin\theta = e^{2i\theta} - 1$ et que $2e^{i\theta}\cos\theta = e^{2i\theta} + 1$
c) Résoudre alors dans \mathbb{C} l'équation (E).
- 3) Le plan complexe étant muni d'un repère orthonormé direct (O, \vec{u}, \vec{v}) . On donne les points A et B d'affixes respectifs 1 et $e^{2i\theta}$
- a) Déterminer l'ensemble des points B quand θ varie dans $]0, \frac{\pi}{2}[$.
b) Déterminer l'affixe du point C tel que le quadrilatère OACB soit un parallélogramme, puis vérifier que OACB est un losange.
c) Déterminer le réel θ pour que la mesure de l'aire \mathcal{A} du losange OACB soit égale à $\frac{1}{2}$
(indication : Montrer d'abord que $\mathcal{A} = \sin 2\theta$)

EXERCICE 7:

Pour tout réel $\theta \in]0, \pi[$ on donne l'équation dans \mathbb{C} :

$$(E_\theta) : z^2 - e^{i\theta}(1 + e^{i\theta})z + e^{i3\theta} = 0$$

- 1) a) Résoudre dans \mathbb{C} l'équation (E_θ) .
b) En déduire les solutions dans \mathbb{C} de l'équation $(E'_\theta) : z^6 - e^{i\theta}(1 + e^{i\theta})z^3 + e^{i3\theta} = 0$.
- 2) Le plan complexe étant muni d'un repère orthonormé direct (O, \vec{u}, \vec{v}) . Soient A, B et C les points du plan d'affixes respectives 1, $e^{i\theta}$ et $e^{i2\theta}$.
- a) Montrer que le triangle ABC est isocèle en B.
b) Montrer que ABC est équilatéral si et seulement si $|1 + e^{i\theta}| = 1$
- 3) a) Déterminer le module et un argument du complexe $1 + e^{i\theta}$.
b) En déduire les valeurs de θ pour lesquelles le triangle ABC est équilatéral.