

Exercice 1 (5 points)

On considère les nombres complexes $z_1 = 2\sqrt{2} + 2i\sqrt{2}$ et $z_2 = \sqrt{3} - i$.

1) a- Mettre z_1 et z_2 sous la forme exponentielle.

b- En déduire la forme exponentielle de chacun des nombres complexes :

$$(-2\sqrt{2} - 2i\sqrt{2})^3; -3i(2\sqrt{2} - 2i\sqrt{2}); (2\sqrt{2} + 2i\sqrt{2})(\sqrt{3} - i) \text{ et } \frac{2\sqrt{2} + 2i\sqrt{2}}{\sqrt{3} - i}.$$

2) a- Calculer le produit $z_1 z_2$ sous la forme algébrique.

b- Déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

c- Prouver alors que $\tan\left(\frac{\pi}{12}\right) = 2 - \sqrt{3}$.

Exercice 2 (5 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) . On donne les points A, B, C et I d'affixes respectives 4 ; 2i ; 3+3i et 1.

1) Montrer que le triangle ABC est isocèle rectangle en C.

2) On associe, à tout point M d'affixe $z \neq 2i$, le point M' d'affixe $z' = \frac{z-4}{z-2i}$.

a- Montrer que $IM' \cdot BM = 2\sqrt{5}$.

b- En déduire que si M' appartient au cercle (C') de centre I et de rayon $\sqrt{5}$ alors M varie sur un cercle (C) dont on précisera le centre et le rayon.

3) a- Déterminer et construire l'ensemble (E) des points M lorsque $|z'| = 1$.

b- Déterminer et construire l'ensemble (E') des points M pour que z' soit un réel.

Exercice 3 (6 points)

Soit f la fonction définie sur IR par :
$$\begin{cases} 1 - \frac{\sin(4x)}{x} & \text{si } x < 0 \\ x^3 + 2x - 3 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}.$$

1) a- Montrer que pour tout $x < 0$, on a : $1 + \frac{1}{x} \leq f(x) \leq 1 - \frac{1}{x}$.

b- En déduire $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

2) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis $\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right)$.

3) a- Montrer que f est continue en 0.

b- Montrer que f est continue sur chacun des intervalles $]-\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$.

4) a- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution dans $]0; 2[$.

b- Donner le signe de f(x) lorsque x varie dans $]0; +\infty[$.

Exercice 4 (4 points)

La courbe ci-dessous, représente une fonction g définie sur $[-5 ; 5]$ et on admet que $g(-4)=-2$, $g(-1)=1$, $g(2)=3$ et $g(4)=-1.4$.

1) a- Dresser le tableau de variation de g sur $[-4 ; 4]$.

b- Montrer que l'équation $g(x)=0$ admet une unique solution dans $]2 ; 4[$.

2) Soit f la fonction définie par $f(x)=3x^2-x+2+3\sin x$.

a- Justifier la continuité de f sur \mathbb{R} .

b- Montrer que $\frac{f}{g}$ est continue sur $[-1 ; 3]$.

c- Montrer que \sqrt{g} est continue sur $[-1 ; 3]$.

