

Devoir de synthèse N°1

Exercice 1 : (4pts)

Indiquer la bonne réponse :

- 1) Soit f une fonction dérivable sur $[1, 4]$ telle que $|f'(x)| \leq 5$ pour $x \in [1, 4]$ alors
 - a) $|f(4) - f(1)| \leq 5$
 - b) $|f(4) - f(1)| \leq 15$
 - c) $|f(4) - f(1)| \leq 25$
- 2) L'équation $z^2 + (1-i)z + 1 = 0$ admet deux solutions :
 - a) opposées
 - b) conjuguées
 - c) inverses.
- 3) Soient les points A et B d'affixes respectives $1+i$ et $1-i$.
L'ensemble des points M d'affixes z tel que : $|z - 1 - i| = 3$ est :
 - a) Le cercle de centre A et de rayon 3
 - b) Le cercle de centre B et de rayon 3
 - c) La médiatrice de $[AB]$.
- 4) L'équation $z^2 - (1+2i)z + i = 0$ admet dans \mathbb{C} deux solutions z' et z'' qui vérifient :
 - a) $z' \times z'' = -i$
 - b) $|z'| = |z''|$
 - c) $z' + z'' = 1+2i$

Exercice 2 : (7pts)

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{1 + \frac{1}{x}}$

On note (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j})

- 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
b) Interpréter graphiquement les deux résultats.
- 2) a) Montrer que f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et pour tout réel $x \in]0, +\infty[$ on a : $f'(x) = \frac{-1}{2x^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x}}}$
b) Dresser le tableau de variation de f .
c) Tracer (C_f) dans le repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) .
- 3) Soit la fonction $h(x) = f(x) - x$
 - a) Dresser le tableau de variation de h .
 - b) Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet dans $]0, +\infty[$ une unique solution α
 - c) Vérifier et que $1 < \alpha < \sqrt{2}$
- 4) a) Montrer que f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.
b) Tracer dans le même repère (C_f^{-1}) la courbe de f^{-1} .
c) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour $x \in J$.

Exercice 3 : (5pts)

1) Résoudre dans \mathbb{C} l'équation : $z^2 - (1+i)z + i = 0$

2) Soit $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$ on considère l'équation dans \mathbb{C} . $E_\theta : z^2 - 2 e^{i\theta} \cos\theta z + e^{i2\theta} = 0$

a) Vérifier que 1 est une solution de E_θ .

b) En déduire l'autre solution de E_θ .

3) Le plan complexe étant rapporté à un repère orthonormé.

On désigne par A et B les points d'affixes respectives 1 et $e^{i2\theta}$

a) Déterminer l'affixe du point C tel que OACB soit un losange.

b) Déterminer la valeur de θ pour que la mesure de l'aire du losange OACB soit égale à $\frac{1}{2}$.

Exercice 4 : (4pts)

Le plan est rapporté à un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j})

La courbe (C) ci-dessous représente une fonction f définie sur $[1, +\infty[$.

On suppose que la courbe (C) admet :

Une asymptote Δ d'équation $y = 2x$ au voisinage de $+\infty$.

Une demi-tangente verticale au point d'abscisse 1.

1) Donner par une lecture graphique :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)-1}{x-1}$

b) Le tableau de variation de f

2) Montrer que f est une bijection de $[1, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.

3) Reproduire le graphique et tracer la courbe de f^{-1} .

4) On admet que $f(x) = x + \sqrt{x^2 - 1}$

Déterminer $f^{-1}(x)$

