


Le sujet comporte 4 pages. La page 4 / 4 est à rendre avec la copie.

**Exercice 1 (6 points)**

Dans la figure ci-contre,

- ABCDEFGH est un cube d'arête 1.
- $\overline{AI} = \overline{EJ} = \frac{\sqrt{2}}{2} \overline{AD}$

On note  $\vec{i} = \overline{AB}$ ,  $\vec{j} = \overline{AD}$  et  $\vec{k} = \overline{AE}$  et on munit l'espace du repère orthonormé direct  $(A, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ .



1) a) Déterminer les coordonnées des points F, G, I et J.

b) Justifier qu'une représentation paramétrique de la droite (IJ) est  $\begin{cases} x = 0 \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ z = \alpha \end{cases}; \alpha \in \mathbb{R}$ .

Dans la suite de l'exercice  $\alpha$  est un réel et M est un point de la droite (IJ)

de coordonnées  $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \alpha\right)$ .

2) a) Vérifier que  $\overline{AF} \wedge \overline{AM} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \vec{i} - \alpha \vec{j} + \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{k}$  et que  $\overline{BC} \wedge \overline{BM} = \alpha \vec{i} + \vec{k}$ .

b) En déduire que les triangles AFM et BCM ont la même aire.

3) a) Montrer que  $(\overline{AF} \wedge \overline{AM}) \cdot \overline{AG} = -\alpha$  et que  $(\overline{BC} \wedge \overline{BM}) \cdot \overline{BG} = 1$ .

b) Montrer que

(M, A, F et G sont coplanaires) si et seulement si (M et I sont confondus).

c) Déterminer les points M de la droite (IJ) pour lesquels AFMG et BCMG sont deux tétraèdres de même volume.

### Exercice 2 (4 points)

Une enquête faite dans un établissement scolaire (E) a montré que 9 élèves sur 30 consomment des drogues. Un test de dépistage est effectué pour un élève. On désigne par A l'événement "l'élève testé est un consommateur de drogues".

- 1) Déterminer  $p(A)$ .
- 2) Une association de lutte contre les drogues a entamé une action dans cet établissement. Elle a organisé une session de traitement pour les consommateurs de drogues et une session de sensibilisation pour les non consommateurs. L'association a constaté que :  
Parmi les élèves consommateurs de drogues, 65% réussissent à arrêter toute consommation de drogues.  
Parmi les élèves non consommateurs de drogues, 4% deviennent des consommateurs. Un test de dépistage est effectué pour un élève après cette session. Soit B l'événement "l'élève testé à la fin de la session est un consommateur de drogues".
  - a) Déterminer  $p(B/A)$  et  $p(\bar{B}/A)$ .
  - b) Déterminer  $p(B/\bar{A})$  et  $p(\bar{B}/\bar{A})$ .
  - c) Calculer  $p(B)$ .
- 3) Estimer le nombre d'élèves consommateurs de drogues dans une classe de 30 élèves de l'établissement scolaire (E) après la fin de la session.

### Exercice 3 (4 points)

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  par  $f(x) = \cos x$ .

- 1) a) Calculer  $f'(x)$ ,  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ .  
b) Justifier que  $f$  réalise une bijection de  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  sur  $[0,1]$ .
- 2) Soit  $g$  la fonction réciproque de  $f$ .
  - a) Justifier que  $g$  est dérivable sur  $[0,1[$ .
  - b) Montrer que pour réel  $x$  de l'intervalle  $[0,1[$ ,  $g'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ .

(On rappelle que pour tout réel  $x$ ,  $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ ).

- 3) a) Calculer  $g\left(\frac{1}{2}\right)$  et  $g\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ .  
b) Montrer que  $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{6}$ .

#### Exercice 4 (6 points)

Dans l'annexe ci-jointe  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  est un repère orthonormé du plan,  $C_f$  et  $C_g$  sont les courbes représentatives des fonctions  $f$  et  $g$  définies

sur  $]0, +\infty[$  par  $f(x) = e^x - \frac{1}{x}$  et  $g(x) = \ln x - \frac{1}{x}$ .

$C_f$  coupe l'axe des abscisses au point  $A(\alpha, 0)$ .

$C_g$  coupe l'axe des abscisses au point  $B(\beta, 0)$ .

1) a) Donner le signe de  $f(x)$  et celui de  $g(x)$  sur  $]0, +\infty[$ .

b) Justifier que  $e^\alpha = \frac{1}{\alpha}$  et que  $\ln \beta = \frac{1}{\beta}$ .

2) Soit  $h$  la fonction définie sur  $]0, +\infty[$  par  $h(x) = e^x - \ln x$  et  $C_h$  sa courbe représentative dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x)$ .

b) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{x} = +\infty$ .

c) Vérifier que  $h(\alpha) = -g(\alpha)$

d) Dresser le tableau de variation de la fonction  $h$ .

3) a) Vérifier que pour tout réel  $x$  de  $]0, +\infty[$ ,  $f(x) - h(x) = g(x)$ .

b) Etudier la position relative des courbes  $C_f$  et  $C_h$ .

c) Construire  $C_h$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

4) Soit  $a > 0$ . La droite  $\Delta$  d'équation  $x = a$  coupe les courbes  $C_f$  et  $C_g$  respectivement en  $M$  et  $N$ .

Montrer que la distance  $MN$  est minimale pour  $a = \alpha$ .

Annexe à rendre avec la copie

