

Correction de l'épreuve de mathématiques (bac Sciences expérimentales)

Session principale 2017

**Exercice n°1 :**

De quoi s'agit-il ?

- **Produit vectoriel dans l'espace**
- **Droites et plans de l'espace**
- **Sphère, positions relatives d'une sphère et d'un plan, plan tangent à une sphère**
- **Droite tangente à un cercle**

1°) a)  $\overrightarrow{OB} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$  et  $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -8 \end{pmatrix}$ ,

$$\text{Donc } \overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{BC} = \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 4 & -8 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 4 & -8 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \vec{k} = 8\vec{i} + 8\vec{j} + 4\vec{k}.$$

$$\text{Ainsi } \overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

b)  $O \in P \cap (OA)$  ①

$\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{BC}$  est un vecteur normal de P, or  $\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{BC} = 4\overrightarrow{OA}$ , donc  $\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{BC}$  et  $\overrightarrow{OA}$  sont colinéaires, d'où  $\overrightarrow{OA} \perp P$  ②

d'après ① et ② ; on conclut que (OA) est perpendiculaire au plan P en O.

c) On a :  $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -8 \end{pmatrix}$  et  $\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}$   $\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}$  ainsi,

$$d(O, (BC)) = \frac{\|\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{BC}\|}{\|\overrightarrow{BC}\|} = \frac{\sqrt{8^2 + 8^2 + 4^2}}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 8^2}} = \sqrt{2}.$$

2)  $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 4y - 2z - 2 = 0$  signifie  $(x-2)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 2 + 2^2 + 2^2 + 1^2$   
signifie  $(x-2)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 11 > 0$

Donc (S) est la sphère de centre A(2,2,1) et de rayon R =  $\sqrt{11}$ .

3) a)  $OA = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = 3$ .

b) D'après la question 1-b), O est le projeté orthogonal de A sur le plan P, donc  $d(A, P) = OA = 3 < R = \sqrt{11}$ .

Ainsi ; P coupe la sphère (S) suivant un cercle de centre O et de rayon

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{\sqrt{11}^2 - 3^2} = \sqrt{11 - 9} = \sqrt{2}.$$

c)  $(BC) \subset P$  ;  $C \subset P$  et  $d(O, (BC)) = \sqrt{2}$  donc  $(BC)$  est tangente au cercle  $C$ .

4) a) On a :  $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -8 \end{pmatrix}$  et  $\overrightarrow{BH} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$ , d'où  $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{BH}$ ,

donc  $\overrightarrow{BC}$  et  $\overrightarrow{BH}$  sont colinéaires, ainsi  $H \in (BC)$  (\*).

$$OH = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 0^2} = \sqrt{2} = r \quad (**).$$

D'après (\*) et (\*\*), on conclut que  $(BC) \cap C = \{H\}$ .

## Exercice n°2 :

De quoi s'agit-il ?

- Résolution d'une équation du second degré dans IC
- Complexe et géométrie

1) a)  $(\sqrt{5} + 2i)^2 = \sqrt{5}^2 + 2 \times \sqrt{5} \times 2i + (2i)^2 = 5 + 4i\sqrt{5} - 4 = 1 + 4i\sqrt{5}$ .

b)  $\Delta = [-(\sqrt{5} + 2i)]^2 - 4 \times 1 \times (1 + 4i\sqrt{5}) = (\sqrt{5} + 2i)^2 - 4(1 + 4i\sqrt{5}) = -3(\sqrt{5} + 2i)^2$ .

c)  $\Delta = -3(\sqrt{5} + 2i)^2 = [i\sqrt{3}(\sqrt{5} + 2i)]^2$ , donc  $\delta = i\sqrt{3}(\sqrt{5} + 2i)$  par suite :

$$a = \frac{\sqrt{5} + 2i + i\sqrt{3}(\sqrt{5} + 2i)}{2} = \frac{(\sqrt{5} + 2i)(1 + i\sqrt{3})}{2} = (\sqrt{5} + 2i) \left( \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\text{et } a = \frac{\sqrt{5} + 2i - i\sqrt{3}(\sqrt{5} + 2i)}{2} = \frac{(\sqrt{5} + 2i)(1 - i\sqrt{3})}{2} = (\sqrt{5} + 2i) \left( \frac{1 - i\sqrt{3}}{2} \right).$$

Donc les solutions de (E) sont a et b.

2) a)  $OQ = |z_Q| = |\sqrt{5} + 2i| = \sqrt{\sqrt{5}^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$ , donc  $Q \in C_{(0,3)} = C$ .

b)  $Q \in C \cap \{y=2\}$ , avec  $\text{Re}(z_A) > 0$ .

3) a)  $OA = |a| = \left| (\sqrt{5} + 2i) \left( \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} \right) \right| = \frac{1}{2} |(\sqrt{5} + 2i)| \cdot |1 + i\sqrt{3}| = \frac{1}{2} OQ \times \sqrt{4} = 3$ . Donc  $A \in C$ .

$$OB = |b| = \left| (\sqrt{5} + 2i) \left( \frac{1 - i\sqrt{3}}{2} \right) \right| = \frac{1}{2} |(\sqrt{5} + 2i)| \cdot |1 - i\sqrt{3}| = \frac{1}{2} OQ \times \sqrt{4} = 3$$
. Donc  $B \in C$ .

b)  $z_{\overline{OA}} + z_{\overline{OB}} = a + b = (\sqrt{5} + 2i) \left[ \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} + \frac{1 - i\sqrt{3}}{2} \right] = \sqrt{5} + 2i = z_Q = z_{\overline{OQ}}$ .


Ainsi  $\overline{OA} + \overline{OB} = \overline{OQ}$ .

c) On a :  $\overline{OA} + \overline{OB} = \overline{OQ}$  donc le quadrilatère  $OAQB$  est un parallélogramme, de plus  $OA = OB$  ainsi  $OAQB$  est un losange.

d) On construit le point  $I$  milieu du segment  $[OQ]$

La perpendiculaire à  $(OQ)$  passant par  $I$  coupe le cercle  $C$  en  $A$  et  $B$  tel que

$$\text{Im}(z_A) > 0, \text{ car } a = \frac{\sqrt{5} - 2\sqrt{3}}{2} + i \frac{2 + \sqrt{15}}{2} \text{ et } b = \frac{\sqrt{5} + 2\sqrt{3}}{2} + i \frac{2 - \sqrt{15}}{2}.$$



### Exercice n°3 :

De quoi s'agit-il ?

- Fonction en exponentielle (limites, variations, points d'inflexions, construction de points sur une représentation graphique donnée)
- Calcul d'aires
- Fonctions primitives
- Valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle

$$1) \quad \left. \begin{array}{l} \text{a) } \lim_{x \rightarrow -\infty} (1+x^2) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^x} = +\infty \end{array} \right\} \text{ alors } \lim_{-\infty} f = +\infty .$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1+x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty .$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1+x^2}{x} \cdot e^{-x} = -\infty .$$

(C) admet une branche parabolique de direction celle de  $(0, \vec{j})$ .

$$\text{c) } \lim_{+\infty} f = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x^2)e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} + x^2 e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} + \frac{x^2}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} + \frac{1}{\frac{e^x}{x^2}} = 0 + 0 = 0 .$$

Donc l'axe des ordonnées est une asymptote à (C) au voisinage de  $+\infty$ .

$$2) \quad \text{a) Pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = 2xe^{-x} - e^{-x} \times (1+x^2) = (2x - (1+x^2))e^{-x} \\ = (-x^2 + 2x - 1)e^{-x} = -(x^2 - 2x + 1)e^{-x} = -(x-1)^2 e^{-x} .$$

$$\text{b) Pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) \leq 0 \quad \text{et} \quad f'(1) = 0 .$$

$x$	$-\infty$	$1$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$0$	$-$
$f(x)$	$+\infty$	$0$	

3) a)  $T_0 : y = f'(0)x + f(0)$  avec  $f'(0) = -e^0 = -1$  et  $f(0) = e^0 = 1$ .

b) Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f''(x) = -[2 \times 1 \times (x-1)e^{-x} - e^{-x}(x-1)^2]$ .

$$= -e^{-x}(2x - 2 - x^2 + 2x - 1) = (x^2 - 4x + 3)e^{-x}$$

$$= (x-1)(x-3)e^{-x}.$$

Le signe de  $f''(x)$  est celui de  $(x-1)(x-3)$ .

$x$	$-\infty$	$1$	$3$	$+\infty$
$f''(x)$	$+$	$0$	$-$	$+$

Ainsi A et B sont deux points d'inflexions de (C).

4) a) On a pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) = (1+x^2)e^{-x} = (1+x^2)g(-x)$ .

Donc :  $f(1) = 2g(-1)$  et  $f(3) = 10g(-3)$ .

b)  $A(1; f(1))$  et  $f(1) = 2g(-1) = 2y_E$ , donc  $A(1; 2y_E)$ .

$B(3; f(3))$  et  $f(3) = 10g(-3) = g(\ln(10) - 3) = y_F$ , donc  $B(3; y_F)$ .

$T_3$  est la tangente à (C) en B.

$$T_3 : y = f'(3)(x-3) + f(3) = -4e^{-3}(x-3) + 10e^{-3}$$

Ainsi  $T_3 : y = -4e^{-3}x + 22e^{-3}$ .

et comme  $-4e^{-3} \times \frac{11}{2} + 22e^{-3} = -22e^{-3} + 22e^{-3} = 0$ , donc  $K \in T_3$ . Ainsi  $T_3 = (BK)$ .

5) a)  $T_3$  est la tangente à (C) en B.

$$T_3 : y = f'(3)(x-3) + f(3) = -4e^{-3}(x-3) + 10e^{-3}$$

Ainsi  $T_3 : y = -4e^{-3}x + 22e^{-3}$ .

et comme  $-4e^{-3} \times \frac{11}{2} + 22e^{-3} = -22e^{-3} + 22e^{-3} = 0$ , donc  $K \in T_3$ . Ainsi  $T_3 = (BK)$ .

b) Voir figure.

6) a) Voir figure.

b)  $x \mapsto -(x^2 + 2x + 3)$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et  $x \mapsto e^{-x}$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

Donc  $F$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

$$\begin{aligned} \text{Pour tout } x \in \mathbb{R} ; \quad F'(x) &= -\left[ (2x+2)e^{-x} - e^{-x}(x^2 + 2x + 3) \right] \\ &= -e^{-x}(2x+2 - x^2 - 2x - 3) = -e^{-x}(-x^2 - 1) \\ &= (1+x^2)e^{-x} = f(x). \end{aligned}$$

Ainsi  $F$  est une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .


c)  $S = \int_0^3 f(x) dx = [F(x)]_0^3 = F(3) - F(0) = -18e^{-3} + 3 = 3 - 18e^{-3}.$

d)  $\bar{f} = \frac{1}{3-0} \int_0^3 f(x) dx = \frac{1}{3} S = \frac{1}{3} (3 - 18e^{-3}) = 1 - 6e^{-3}.$

e)  $S = 3 \times \bar{f} = 3 \times (1 - 6e^{-3}).$

Soient  $G'(3 ; 1 - 6e^{-3})$  ;  $F'(3 ; 0)$  et  $A$  l'aire du rectangle  $OF'G'G$ ,

Donc  $S = OF' \times OG = A.$



## Exercice n°4 :

De quoi s'agit-il ?

- Calcul de probabilité d'évènements
- Probabilité conditionnelle, probabilité totale
- Loi binomiale

1) a)  $p(U) = 1 - p(\bar{U}) = 1 - \frac{5}{100} = 0,95$ .

b)  $p(D/U) = \frac{92}{100} = 0,92$  et  $p(D/\bar{U}) = \frac{55}{100} = 0,55$ .

2) a)  $p(D) = p(D \cap U) + p(D \cap \bar{U}) = p(D/U) \times p(U) + p(D/\bar{U}) \times p(\bar{U})$   
 $= 0,92 \times 0,95 + 0,55 \times 0,05 = 0,9015$ .

b)  $p(U/D) = \frac{p(U \cap D)}{p(D)} = \frac{0,92 \times 0,95}{0,9015} = \frac{1748}{1803} \approx 0,9694$ .

3) a)  $p_n = 1 - \bar{p}_n$  avec  $\bar{p}_n$  est la probabilité qu'aucune de ces femmes ait une grossesse multiple.  
C'est à dire que n femmes ait une grossesse unique.

Ainsi :  $p_n = 1 - (p(U/D))^n = 1 - (0,9694)^n$ .

Autrement : X suit une loi binomiale de paramètres n ( $n \geq 2$ ) et  $p = p(\bar{U}/D)$

$$p_n = p(X \geq 1) = 1 - p(X < 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - (0,9694)^n.$$

b)  $p_n > 0,9$  signifie  $1 - (0,9694)^n > 0,9$

signifie  $(0,9694)^n < 0,1$

signifie  $\ln((0,9694)^n) < \ln(0,1)$

signifie  $n \ln(0,9694) < \ln(0,1)$

signifie  $n > \frac{\ln(0,1)}{\ln(0,9694)} \approx 74,09$  car  $\ln(0,9694) < 0$ .

Ainsi le nombre minimal des femmes qui devront accoucher en Juillet 2017  
est  $n = 75$ .