

Baccalauréat session de remplacement**National****1. Exercice 1 (4 points)**

1. Soit g la fonction définie sur l'intervalle $]1; +\infty[$ par : $g(x) = \frac{1}{x(x^2 - 1)}$.

a. Déterminer les nombres réels a , b et c tels que l'on ait, pour tout $x > 1$: $g(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x-1}$.

b. Trouver une primitive G de g sur l'intervalle $]1; +\infty[$.

2. Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]1; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{2x}{(x^2 - 1)^2}$. Trouver une primitive F de f sur l'intervalle $]1; +\infty[$.

3. En utilisant les résultats obtenus précédemment, calculer : $I = \int_2^3 \frac{2x}{(x^2 - 1)^2} \ln x dx$. On donnera le résultat sous la forme $p \ln 2 + q \ln 3$ avec p et q rationnels.

2. Exercice 2 (6 points)

L'exercice comporte une annexe à rendre avec la copie.

Le but de ce problème est d'étudier, pour x et y éléments distincts de l'intervalle $]0; +\infty[$, les couples solutions de l'équation $x^y = y^x$ (E) et, en particulier, les couples constitués d'entiers.

1. Montrer que l'équation (E) est équivalente à $\frac{\ln x}{x} = \frac{\ln y}{y}$.

2. Soit h la fonction définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par $h(x) = \frac{\ln x}{x}$. La courbe (C) représentative de la fonction h est donnée en annexe ; x_0 est l'abscisse du maximum de la fonction h sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

a. Rappeler la limite de la fonction h en $+\infty$ et déterminer la limite de la fonction h en 0.

b. Calculer $h'(x)$, où h' désigne la fonction dérivée de h ; retrouver les variations de h . Déterminer les valeurs exactes de x_0 et $h(x_0)$.

c. Déterminer l'intersection de la courbe (C) avec l'axe des abscisses.

3. Soit λ un élément de l'intervalle $]0; \frac{1}{e}[$.

Prouver l'existence d'un unique nombre réel a de l'intervalle $]1; e[$ et d'un unique nombre réel b de l'intervalle $]e; +\infty[$ tel que $h(a) = h(b) = \lambda$.

Ainsi le couple (a, b) est solution de (E).

4. On considère la fonction s qui, à tout nombre réel a de l'intervalle $]1; e[$, associe l'unique nombre réel b de l'intervalle $]e; +\infty[$ tel que $h(a) = h(b)$ (on ne cherchera pas à exprimer $s(a)$ en fonction de a).

Par lecture graphique uniquement et sans justification, répondre aux questions suivantes :


a. Quelle est la limite de s quand a tend vers 1 par valeurs supérieures ?

b. Quelle est la limite de s quand a tend vers e par valeurs inférieures ?

c. Déterminer les variations de la fonction s . Dresser le tableau de variations de s .

5. Déterminer les couples d'entiers distincts solutions de (E).

A rendre avec la copie.



3. Exercice 3 (5 points)

Un récipient contient un gaz constitué de deux sortes de particules : 75 % de particules A et 25 % de particules B. Les particules sont projetées sur une cible formée de deux compartiments K1 et K2. L'expérience est modélisée de la manière suivante :

- Une particule au hasard parmi les particules de type A entre dans K1 avec la probabilité $\frac{1}{3}$ et dans K2 avec la probabilité $\frac{2}{3}$.
- Une particule au hasard parmi les particules de type B entre dans chacun des compartiments avec la probabilité $\frac{1}{2}$.

Partie A

1. Soit une particule au hasard. Déterminer la probabilité de chacun des événements suivants :

- A1 : « la particule isolée est de type A et elle entre dans K1 » ;
- A2 : « la particule isolée est de type A et elle entre dans K2 » ;
- B1 : « la particule isolée est de type B et elle entre dans K1 » ;
- B2 : « la particule isolée est de type B et elle entre dans K2 » ;
- C1 : « la particule entre dans K1 » ;
- C2 : « la particule entre dans K2 ».

2. On procède 5 fois de suite et de façon indépendante à l'épreuve décrite en introduction. Le nombre de particules étant très grand, on admettra que les proportions 75 % et 25 % restent constantes. Calculer la probabilité de l'événement E suivant : « il y a exactement deux particules dans K2 ».

Partie B

Un récipient contient le gaz décrit précédemment. Les particules A sont radioactives et se transforment spontanément en particules B. On note $p(t)$ la proportion de particules A dans le gaz. Ainsi, à l'instant $t = 0$, on a $p(0) = 0,75$.

Plus généralement, si t est exprimé en années, on a $p(t) = 0,75e^{-\lambda t}$ où λ est une constante réelle. La demi-vie¹ des particules de type A est égale à 5730 ans.

1. Calculer λ ; on prendra une valeur approchée à 10^{-5} près par défaut.
2. Au bout de combien d'années, 10 % des particules de type A se seront-elles transformées en particules de type B ?
3. Déterminer la valeur de t pour laquelle il y aura autant de particules de type A que de particules de type B (on arrondira à l'unité).

4. Exercice 4 (5 points, non spécialistes)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$ (unité graphique 1 cm).

1. Résoudre dans \mathbb{C} l'équation $z^2 - 8z\sqrt{3} + 64 = 0$.
2. On considère les points A et B qui ont pour affixes respectives les nombres complexes $a = 4\sqrt{3} - 4i$ et $b = 4\sqrt{3} + 4i$.
 - a. Ecrire a et b sous forme exponentielle.
 - b. Calculer les distances OA, OB, AB . En déduire la nature du triangle OAB .
3. On désigne par C le point d'affixe $c = -\sqrt{3} + i$ et par D son image par la rotation de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{3}$. Déterminer l'affixe du point D.
4. On appelle G le barycentre des trois points pondérés $(O ; -1), (D ; +1), (B ; +1)$.
 - a. Justifier l'existence de G et montrer que ce point a pour affixe $g = 4\sqrt{3} + 6i$.
 - b. Placer les points A, B, C, D et G sur une figure.
 - c. Montrer que les points C, D et G sont alignés.
 - d. Démontrer que le quadrilatère OBGD est un parallélogramme.

5. Exercice 4 (5 points, spécialistes)

L'exercice comporte une annexe à rendre avec la copie.

A et C sont deux points distincts du plan ; on note Γ le cercle de diamètre $[AC]$ et O le centre de Γ . B est un point du cercle Γ distinct des points A et C.

Le point D est construit tel que le triangle BCD soit équilatéral direct ; on a donc $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}) = \frac{\pi}{3} (2\pi)$.

Le point G est le centre de gravité du triangle BCD. Les droites (AB) et (CG) se coupent en un point M.

Partie A

1. Placer les points D, G et M sur la figure de la feuille annexe.
2. Montrer que les points O, D et G appartiennent à la médiatrice du segment $[BC]$ et que le point G est le milieu du segment $[CM]$.
3. Déterminer l'angle et le rapport de la similitude directe s de centre C transformant B en C.

Partie B

Dans cette question le plan est rapporté à un repère orthonormal direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$ choisi de telle sorte que les points A et C aient pour affixes respectives -1 et $+1$.

¹ Temps au bout duquel le nombre de particules restantes est la moitié du nombre initial.

Soit E le point construit pour que le triangle ACE soit équilatéral directe ; on a donc $(\overline{AC}, \overline{AE}) = \frac{\pi}{3} (2\pi)$.

1. Calculer l'affixe du point E et construire le point E sur la feuille annexe.

2. Soit σ la similitude directe d'expression complexe $z' = \frac{3+i\sqrt{3}}{4}z + \frac{1-i\sqrt{3}}{4}$. Déterminer les éléments caractéristiques de σ et en déduire que σ est la similitude réciproque de s .

3. Montrer que l'image E' de E par σ a pour affixe $-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et montrer que le point E' appartient au cercle Γ .

4. On note Σ le lieu des points M lorsque le point B décrit le cercle Γ privé des points A et C . Montrer que le point E appartient à Σ .

Soit O' l'image du point O par la similitude s . Démontrer que le point O' est le centre de gravité du triangle ACE . En déduire une construction de Σ .

A rendre avec la copie

