

La Réunion

1. Exercice 1

5 points

Soient a et b deux nombres réels strictement positifs tels que $a < b$.

On désigne par A et par B les points d'abscisses respectives a et b de la courbe Γ représentative de la fonction logarithme népérien dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Les points Q et R sont les projetés orthogonaux respectifs des points A et B sur l'axe des ordonnées.

1. a. Donner l'équation réduite de la tangente T au point A à la courbe Γ .

b. Déterminer l'ordonnée du point d'intersection P de T avec l'axe des ordonnées.


Calculer la longueur PQ . En déduire une construction simple de T ; la réaliser sur la figure ci-dessous.

2. Restitution organisée de connaissances : on suppose connue la propriété

« Pour tout couple $(x; y)$ de nombres réels strictement positifs, on a $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$. »

En déduire que, pour tout nombre réel m strictement positif, on a $\ln \sqrt{m} = \frac{1}{2} \ln m$.

3. Utiliser le résultat de la question 2 pour placer sur l'axe des abscisses le point G d'abscisse \sqrt{ab} . Expliquer la construction et la réaliser sur la figure (on laissera les traits de construction apparents).



2. Exercice 2

4 points

Soit a un nombre réel tel que $-1 < a < 0$.

On considère la suite u définie par $u_0 = a$, et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n^2 + u_n$.

1. Étudier la monotonie de la suite u .

2. a. Soit h la fonction définie sur \mathbb{R} par $h(x) = x^2 + x$. Étudier le sens de variations de la fonction h .

En déduire que pour tout x appartenant à l'intervalle $]-1 ; 0[$, le nombre $h(x)$ appartient aussi à l'intervalle $]-1 ; 0[$.

b. Démontrer que pour tout entier naturel n on a : $-1 < u_n < 0$.

3. Étudier la convergence de la suite u . Déterminer, si elle existe, sa limite.

3. Exercice 3

6 points

On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = \frac{xe^x}{e^x - 1}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 1$.

On note C la courbe représentative de f dans un repère orthonormal $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

1. a. Déterminer la limite de f en $-\infty$.

b. Établir que, pour tout nombre réel x non nul, $f(x) = x \left(1 + \frac{1}{e^x - 1} \right)$. En déduire la limite de f en $+\infty$.

2. Donner, sans démonstration, la limite suivante : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x - 1}$ et démontrer que f est continue en 0.

3. a. Démontrer que, pour tout nombre réel x , on a : $e^x \geq x + 1$, et que l'égalité n'a lieu que pour $x = 0$.

b. Calculer la dérivée f' de la fonction f et déterminer la fonction g telle que, pour tout nombre réel x

non nul, $f'(x) = \frac{e^x g(x)}{(e^x - 1)^2}$.

c. Donner le tableau des variations de f .

4. Soient x un nombre réel non nul et les points $M(x ; f(x))$ et $M'(-x ; f(-x))$ de la courbe C .

a. Établir que $f(-x) = \frac{x}{e^x - 1}$, puis déterminer le coefficient directeur de la droite (MM') .

b. On admet que la fonction f est dérivable en 0. Que suggère alors le résultat précédent ?

4. Exercice 4 (non spécialistes)

5 points

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$. A, B, C désignent les points d'affixes respectives $a = -2\sqrt{3}$, $b = \sqrt{3} - 3i$ et $c = 2i$.

1. a. Écrire b sous forme exponentielle.

b. Les points A et C sont représentés sur la figure ci-dessous. Construire à la règle et au compas le point B sur ce dessin (laisser les tracés de construction apparents).

2. On désigne par E le barycentre du système $\{(A ; 1) ; (C ; 3)\}$ et par F le barycentre du système $\{(A ; 2) ; (B ; 1)\}$.

a. Établir que l'afixe e du point E est égale à $-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$.

b. Déterminer l'afixe f du point F .

3. a. Démontrer que le quotient $\frac{e-c}{e-b}$ peut s'écrire ki où k est un nombre réel à déterminer. En déduire que, dans le triangle ABC , le point E est le pied de la hauteur issue de B . Placer le point E sur le dessin.

b. Démontrer que le point F possède une propriété analogue. Placer F sur le dessin.

4. On désigne par H le barycentre du système $\{(A ; 2) ; (B ; 1) ; (C ; 6)\}$.

Démontrer que le point H est le point d'intersection des droites (BE) et (CF) . Qu'en déduit-on pour le point H ?

5. Exercice 4 (spécialistes)

5 points

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$. A, B, C désignent les points d'affixes respectives $a = -2\sqrt{3}$, $b = \sqrt{3} - 3i$ et $c = 2i$.

1. a. Écrire b sous forme exponentielle.

b. Les points A et C sont représentés sur la figure ci-dessous. Construire à la règle et au compas le point B sur ce dessin (laisser les tracés de construction apparents).

c. Déterminer une mesure en radians de l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{AB})$ et de l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{AC})$.

2. Les points E et F ont pour affixes respectives $e = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$ et $f = -\sqrt{3} - i$.

a. Démontrer que les points A, E et C , d'une part, et les points A, F et B , d'autre part, sont alignés.

b. Démontrer que le quotient $\frac{e-c}{e-b}$ peut s'écrire ki où k est un nombre réel à déterminer.

Interpréter géométriquement ce résultat. On admet que, de façon analogue, $\frac{f-c}{f-b}$ peut s'écrire $k'i$ où k' est un nombre réel non nul que l'on ne demande pas de déterminer.

c. Placer les points E et F sur la figure.

3. On désigne par S la similitude indirecte dont l'écriture complexe est $z \rightarrow z' = \frac{1}{2}\bar{z} - \sqrt{3}$.

Déterminer les images par S des trois points A, B et C .

4. Soit H le point d'intersection des droites (BE) et (CF) . Placer le point $S(H)$ sur la figure.

Manque Annexe 2