

Durée : 4 heures

∞ Baccalauréat C Grenoble juin 1972 ∞

EXERCICE 1

Dans le plan complexe, au point m , d'affixe z , on fait correspondre le point M , d'affixe Z , par la transformation T_k définie par

$$Z = kiz + 1 + k^2,$$

k étant un paramètre réel strictement positif et i le nombre complexe de module 1 et d'argument $\frac{\pi}{2}$.

1. Quelle est la nature de la transformation T_k ? Montrer que T_k possède un point invariant, et un seul, ω_k , que l'on déterminera. Préciser les éléments caractéristiques de T_k .
2. Déterminer l'ensemble des points ω_k , lorsque k décrit l'ensemble des réels positifs.
3. k_1 et k_2 étant deux réels strictement positifs, on considère la transformation $T_{k_2} \circ T_{k_1}$ composée de T_{k_1} et T_{k_2} (dans cet ordre).
Montrer que $T_{k_1} \circ T_{k_2} = T_{k_2} \circ T_{k_1}$ si, et seulement si, $k_1 = k_2$.
Quelle est la nature de la transformation $T_k \circ T_k$?

EXERCICE 2

L'ensemble \mathbb{N}^* désigne l'ensemble des entiers naturels non nuls.

1. x et y étant deux éléments de \mathbb{N}^* , premiers entre eux, démontrer que les entiers $x + y$ et xy sont, l'un pair, l'autre impair.
2. Déterminer, dans \mathbb{N}^* , les diviseurs de 84 et les donner dans l'ordre croissant.
3. Déterminer dans \mathbb{N}^* les entiers, a et b , vérifiant simultanément les conditions

$$\begin{aligned} (1) \quad a + b &= 84, \\ (2) \quad M &= \Delta^2, \end{aligned}$$

où M est le plus petit commun multiple de a et de b , et Δ est leur plus grand commun diviseur.

On pourra poser $a = \Delta a'$ et $b = \Delta b'$.

PROBLÈME

On rappelle que \mathbb{R} désigne l'ensemble des réels, \mathbb{R}_+ l'ensemble des réels positifs ou nuls et $\text{Log } x$ le logarithme népérien du nombre réel positif x .

Partie A

On considère la fonction g , de R_+ dans \mathbb{R}_+ , telle que

$$g(t) = \frac{2t}{1+t} - \text{Log}(1+t).$$

1. Étudier les variations de cette fonction.
Montrer qu'il existe un nombre a unique tel que $a > 1$ et $g(a) = 0$.
Montrer que 4 est une valeur approchée à 0,1 près de a . Les calculs devront figurer sur la copie ; indiquer la table numérique utilisée.

2. Calculer la limite de $\frac{g(t)}{t}$

- a. quand t tend vers zéro,
- b. quand t tend vers $+\infty$.

Construire la courbe (\mathcal{C}) représentative de la fonction g dans un repère orthogonal (O, \vec{i}, \vec{j}) du plan affine euclidien. On choisira $\|\vec{i}\| = 1$ et $\|\vec{j}\| = 10$, l'unité de longueur étant le centimètre.

3. En remarquant que l'on a $\frac{t}{t+1} = 1 - \frac{1}{1+t}$, calculer l'aire, S , du domaine limité par l'axe des abscisses $t'Ot$ et l'arc de la courbe (\mathcal{C}) dont les points ont une ordonnée positive ou nulle.

Exprimer S sous la forme d'une fraction rationnelle de a .

Partie B

On considère la fonction f , de \mathbb{R} dans \mathbb{R} , définie par

$$f(x) = e^{-x} \operatorname{Log} (1 + e^{2x}).$$

1. Vérifier que $f''(x)$ a le même signe que $g(e^{2x})$.

En déduire le sens de variation de la fonction f .

Montrer que le maximum de $f(x)$ est $\frac{2\sqrt{a}}{1+a}$.

2. Déterminer la limite de $f(x)$

- a. quand x tend vers $+\infty$; on pourra remarquer que $1 + e^{2x} = e^{2x} (1 + e^{-2x})$;
- b. quand x tend vers $-\infty$; on pourra poser $e^{2x} = u$ et faire apparaître $\operatorname{Log} (1 + u)$.