

Baccalauréat C Montréal juin 1978

EXERCICE 1

4 POINTS

1. Quel est le reste de la division euclidienne de 3 670 par 11 ?
2. Quel est le reste de la division euclidienne de 3 670 par 61 ?
3. Quel est le reste de la division euclidienne de 3 671 par 671 ?

EXERCICE 2

4 POINTS

Dans un espace affine euclidien rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ on considère l'application f , qui, à un point M de coordonnées $(x; y; z)$ fait correspondre le point M_1 de coordonnées $(x_1; y_1; z_1)$ où :

$$\begin{cases} x_1 &= \frac{1}{3}(-2x - 2y + z + 2) \\ y_1 &= \frac{1}{3}(-2x + y - 2z + 3) \\ z_1 &= \frac{1}{3}(x - 2y - 2z + 4) \end{cases}$$

Montrer que f est la symétrie orthogonale par rapport à une droite que l'on déterminera.

vspace0,5cm

PROBLÈME

12 POINTS

Le plan affine euclidien orienté (P) est rapporté à un repère orthonormé direct (O, \vec{i}, \vec{j}) .

Partie A

1. a. Soit A le point d'affixe $(3 + i)$ et B le point d'affixe 6 . Pour tout réel u , on considère les deux points M_u d'affixe $3 - \sin u + i \cos u$ et N_u d'affixe $3(1 + \cos u) + 3i \sin u$.

Montrer qu'il existe une unique similitude directe T_u telle que

$$T_u(A) = M_u \quad \text{et} \quad T_u(B) = N_u.$$

- b. Déterminer les éléments géométriques de T_u .

- c. Soit $E = \{T_u, u \in \mathbb{R}\}$.

Démontrer que (E, \circ) est un groupe commutatif.

2. On pose $B_0 = B$, $B_1 = T_{\frac{\pi}{2}}(B)$, $B_2 = T_{\frac{\pi}{2^2}}(B_1)$,

$$\text{et } \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad B_n = T_{\frac{\pi}{2^n}}(B_{n-1}).$$

Calculer en fonction de n les coordonnées de B_n .

Quelle est la position limite du point B_n quand n tend vers $+\infty$?

Partie B

Soit (C) le sous-ensemble de (P) d'équation

$$(y - 8y + 15)e^{y-3} + 3 - x = 0$$

et soit (C_1) l'image de (C) par $T_{\frac{\pi}{2}}$.

1. Montrer que (C_1) a pour équation

$$y = (x^2 + 2x)e^{-x}$$

2. Soit f la fonction définie pour tout x réel par

$$f(x) = (x^2 + 2x)e^{-x}$$

- a. Étudier le comportement de x^2e^{-x} quand x tend vers $+\infty$ (on pourra utiliser $\text{Log}(x^2e^{-x})$).

- b. Étudier la fonction f .

Construire (C_1) dans le repère (O, \vec{i}, \vec{j}) . On donne $\exp(\sqrt{2}) \approx 4,1$.

En déduire la construction de (C) dans le même repère.

3. a. Calculer $\int_0^x (t^2 + 2t)e^{-t} dt$.

- b. Soit m un nombre réel positif. Calculer l'aire de la portion de plan comprise entre (C) et les droites d'équation $x = 3, y = 5, y = 3 - m$ en intégrant par parties.

Cette aire a-t-elle une limite quand m tend vers $+\infty$?